

## ***Argyranthemum sundingii* L. Borgen (Asteraceae)**

### ESTADO DE CONSERVACIÓN

Taxón representado por una única población conocida, en un área de creciente actividad agrícola. Recientemente afectada por el nuevo trazado de un camino agrícola, que ha disminuido el número de sus individuos considerablemente. Su tasa de regeneración poblacional es baja, lo que dificulta su pervivencia y permite considerar el taxón como «en peligro».

### COROLOGÍA

Endemismo tinerfeño. Representado por escasos ejemplares en la vertiente meridional de la Península de Anaga, en el NE de la isla, sobre altitudes medias-bajas, en torno a los 250 m s. m.

### ECOLOGÍA

Participa en los matorrales de degradación de las comunidades de *Oleo-Rhamnetea crenulatae* Santos in Rivas-Martínez 1987, y cardonales húmedos, con suelos profundos. Exhibe, por tanto, hábitos relativamente nitrófilos.

### BIOLOGÍA

Caméfito (30-80 cm altura), ramificado, con hojas divididas y llamativos capítulos blancos y amarillos. Período de floración amplio, en primavera-verano. Se multiplica con facilidad por semilla y también por esqueje.

### VALOR POTENCIAL

Posible interés fitoquímico. Interés ornamental tanto para jardinería (flor cortada o maceta), como para programas de mejora genética. Estos prometen ser muy activos en los años venideros al haberse recolectado una gran parte del germoplasma del género.

### MEDIDAS DE CONSERVACIÓN EXISTENTES

La única población se encuentra dentro del área del parque rural de «Anaga», así recalificado por la reciente Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Natura-