

***Helianthemum broussonetii* Dun. ex DC. (Cistaceae)**

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Raro endemismo, que se distribuye en poblaciones muy pequeñas por localidades dispersas de dos de las islas del archipiélago, en ocasiones próximas a pistas forestales y a caseríos aislados, o en valles angostos y profundos, con cierta actividad agrícola de cultivos terrazados y pastoreo de cabras.

COROLOGÍA

Habita en las islas de Tenerife (Macizo de Anaga, Ladera de Güimar y Bco. de Badajoz) y La Palma (Bco. de Las Lajas, El Rincón, Los Sauces, etc.). Entre 400 y 1.000 m s. m.

ECOLOGÍA

Habita en claros soleados y lomas pedregosas, formando parte de matorrales camefíticos preferentemente en el dominio del monte verde (*Pruno-Lauretea azori-cae* Oberdorfer ex Rivas-Martínez & al. 1977).

BIOLOGÍA

Caméfito de 30 cm o mayor, con hojas oblongo-lanceoladas y flores de color amarillo pálido, con sépalos densamente blanco-tomentosos. Floración y fructificación en primavera.

VALOR POTENCIAL

Especie de indudable interés científico por su escasez, rareza y reducida área de distribución.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN EXISTENTES

Las localidades del área de distribución de la especie en la isla de Tenerife, se encuentran dentro del parque rural de «Anaga» y del parque natural de «Corona Forestal» (parte oriental) de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. En La Palma, sólo una localidad se encuentra incluida en el parque natural de «Las Nieves» de la Ley antes citada.