

88.- **Ornithogalum concinnum** (Salisb.) Coutinho - Especie frecuente en los suelos ácidos de la provincia de Salamanca, ya en fisuras anchas de cuarcitas o en suelos poco profundos sobre granitos, siendo particularmente abundante en el oeste provincial. Todos los ejemplares que se reparten pertenecen a la misma población y en ellos se puede observar, según el grado de floración, la variación de algunos de los caracteres que se utilizan para separar esta especie con la próxima *Ornithogalum unifolium* Ker-Gawler; así, numerosos ejemplares presentan una sola hoja, pocas flores y el tamaño del bulbo es altamente variable; los caracteres más constantes son la longitud de las hojas (iguales o más cortas que el escapo) y el pedicelo fructífero claramente manifiesto; creemos que estos dos caracteres, así como la época de floración, son las únicas diferencias nítidas entre las dos especies en cuestión.

Por otra parte no entendemos cómo C. Zahariadi en *Flora Europaea* V, 1980:40, puede poner en duda la presencia de esta especie en España cuando recoge (l.c. 431) el sinónimo *O. subcucullatum* Rouy & Coincy, cuyos autores la describieron con material procedente de la provincia de Avila y que el mismo Willkomm recoge en su *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae* 1893:53. Además están otras citas posteriores, de las cuales ya se ha ocupado M. Lainz (*Algunas observaciones a propósito de «Flora Europaea»* volumen V. *Bol. Ciencias naturaleza I.D.E.A.* 26, 1980:5).