

3.2.9. San Úrbez y puente de Añisclo

El puente de San Úrbez es la principal vía de entrada a la parte media y alta del valle de Añisclo, y está situado a unos 950 m de altitud.

Como ya hemos comentado, la flora y vegetación más interesante es la de los roquedos y las gleras. En concreto podemos ver las mejores poblaciones de *Pinguicula longifolia* subsp. *longifolia* y *Petrocoptis crassifolia*, notables endemismos del Pirineo central. Además, Añisclo junto con Escuaín son los valles del Parque por donde penetran numerosas plantas mediterráneas que tienen aquí su límite norte de distribución como *Sarcocapnos enneaphylla* (San Úrbez), la encina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*), la carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*), el romero (*Rosmarinus officinalis*) o el durillo (*Viburnum tinus*).

Sin embargo la planta más destacable es un parásito de algunas megaforbias recientemente descrito para la ciencia, *Orobanche montserratii*, que sólo se conoce de esta localidad, así como una zarza endémica ibérica llamada *Rubus castroviejoi*, en límite norte. Alguno de sus núcleos podría verse afectado por el acondicionamiento del camino.

Especies endémicas pirenaicas y catalogadas (*)

- *Antirrhinum sempervirens* subsp. *sempervirens*
- *Campanula speciosa* subsp. *speciosa*
- **Orobanche montserratii*
- **Petrocoptis crassifolia*
- *Picris hieracioides* subsp. *riellii*
- **Pinguicula longifolia* subsp. *longifolia*
- **Ramonda myconi*
- **Ruscus aculeatus*
- *Saxifraga umbrosa* subsp. *umbrosa*
- **Scrophularia pyrenaica*
- *Teucrium pyrenaicum* subsp. *guarense*
- *Thymus vulgaris* subsp. *palaearensis*.

Comunidades vegetales más relevantes:

- *Adiantum-Pinguiculetum longifoliae* (7220*)
- *Asplenium csikii-Petrocoptidetum crassifoliae* (8210)
- *Picrido-Stipetum calamagrostis* (8130)
- *Pinguiculo longifoliae-Caricetum brachystachys* (7220*)
- *Saxifraga longifoliae-Ramondetum myconi* (8210)
- *Urtico dioicae-Scrophularietum pyrenaicae*.

3.2.10. Cuello Arenas-Llano Tripals

Cuello Arenas alberga pastos extensivos veraniegos a 1900 m de altitud en la cabecera del barranco de la Pardina (Añisclo). Principalmente la recorre el ganado vacuno, aunque también se aprovecha en tránsito por el ganado lanar.

En principio este tipo de vegetación está plenamente adaptado al pisoteo y al pastoreo. Por otra parte, la frecuentación turística es más bien baja, pues las visitas a este sector del Parque se hacen preferentemente por la pista de las Cutas y Siarracils para acceder a Góriz y Monte Perdido.

Lo más preocupante son las profundas rodadas la pista que va desde Cuello Arenas al Cuello Gordo que han erosionado el suelo, situación que agudiza la escorrentía tras las tormentas. Se debería restringir al mínimo el acceso por este camino para paliar estos daños.