

Anglis, meadow Barley-grafs.

Habitat in pratis et pascuis humidiusculis. 2. VI.

3. HORDEUM flosculis lateralibus masculis aristatis, *marinum*.
involucro interno florum lateralium semiovato.

Gramen secalinum palustre et maritimum. *R. syn.* 392.

Gramen secalinum maritimum minus. *Hist. Ox. III.*

179. t. 6. f. 5.

Anglis, sea Barley-grafs.

Habitat in pratis et pascuis. 5. V. VI.

4. HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis ari-*sylvati-*
statis, involucris basi connatis arista brevioribus. *cum.* X
Elymus spica erecta: spiculis bifloris involucro æqua-
libus. *Maniff. I.* 35. *europæ-*
us.

Gramen secalinum majus sylvaticum. *R. syn.* 392.

Hist. Ox. III. 180.

Gramen secalinum maximum. *Park.* 1144. *Merr.*

Gramen hordeaceum montanum. f. majus. *B. pin.* 9.

Gramen hordeaceum montanum, spica strigosiore,
brevius aristata. *Sch. agr.* 16. *pr. t. I. f. bona.*

Anglis, wood Barley-grafs.

Habitat in sylvis, solo calcareo. In Stoken-Church
Woods, Oxfordshire, circa Marlow et Henley.
2. VI.

Obs. Pedicellus in omnibus speciebus elongatus in sulco
longitudinali florum reconditus, ut alteram foliolam in-
volucris apparet, et subinde florem abortivum sustinet.

TRITICUM. 99.

Cal. bivalvis, solitarius, subtriflorus. Flos obtusius-
culus, acutus.

1. TRITICUM calycibus subulatis multifloris, floscu-*repens.*
lis mucronatis.

Triticum calycibus quadrifloris subulatis acuminatis
foliis planis. *Sp. pl.* 128. *Schreb. gram. II.* 24.
t. 26.

Gramen caninum. *Ger. em.* 23. vulgatius. *Park.* 1173.
Hist. Ox. III. 178. t. 1. f. 8.

Gramen caninum arvense. f. Gramen Dioscoridis.
B. pin. 1. th. 7.

Gramen