

skala. Najčastejšie sa vyskytuje v spoločenstvách zväzu *Seslerio-Festucion duriusculae*.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 40. Slovenskom prechádza severná hranica areálu. Rastie roztrúsene, celkove vzácne v podoblasti Praecarpaticum v širokom okolí Nového Mesta nad Váhom, v skupine, Vršatca, v okolí Nitry, Partizánskeho, pri Vyhniach, pri Lubietovej, vo východnej časti Stredného Pohornádia, v pohorí Vihorlat, v panónskej oblasti v Slovenskom krase.

Pannonicum. **3.** Jelšava, vrch Dúbrava (Hendrych Acta Univ. Carol., ser. biol. 3: 54, 1957). – Jelšava, vrch Stráňa (Hendrych l.c.). – Zádielska dolina (Hulják 1907 BP, 1908a: 242; Domin 1923e: 331; Futák 1956 SAV). – Zádielsky kameň – Turniansky hrad (Brym 1932: 104; Bertová 1958 SLO).

Carpaticum. **10.** Višňové (Holuby 1858: 59, 1900a: 86). **11.** Temätín (J. Knapp 1856b: 150; Holuby 1872d: 210). Lokalita pravdepodobne zanikla, neskoršie tu tento druh nikto nezistil (cfr. tiež Domin 1931a: 114). – Beckov (Holuby 1865h: 267, 1877 BP, 1878c: 160, 1895 BP; Bertová 1958 SLO). **12.** Žibrica (Vlach 1938 PRC). – Brodzany, Podbralie (Pantocsek Fl. exs. austro-hung. No 2560, 1896 BP; Futák 1964). **13.** Oslany, Veľký vrch (Bralie) (Scheffer 1918 SLO, 1927: 280; Suza 1931a: 172). Chalmová, vrch Lubín (Michalko 1956). **14e.** Sklené Teplice, vrch Bukovec (Kupčok et Hlavaček 1936 BRA, PRC; Hlavaček 1937f: 110, 1955 SAV). **18.** Jaklovská skala (Domin 1920 PRC; Suza 1937 PRC). – Margecany, Kurtova skala (Sillinger 1929 PRC; Futák 1943, mapa III). – Trebejov W (Michalko 1956). – Družstevná pri Hornáde, (Májovský sec. Jos. Dostál 1952a: 66; Michalko 1956 SAV). – Trebejov – Družstevná pri Hornáde – (Jurko 1951a: 62). **20.** Vrch Sokol (Májovský 1950 SLO; Michalko Biológia, Bratislava 10: 355, 1955; Gallo 1965 SAV). **22.** Železničná zastávka Lubietová, vrch Sokol (Trapl 1923 PRC, 1930: 120; Suza 1937 PRC; Futák 1943: 32). **27.** Babky (Holuby 1879c: 64).

Pochybný údaj. Pannonicum. **6.** Štúrovo NW, kóta 220 (Hostička et Zelený Zpr. Čs. bot. Společ. 2: 262, 1967). – Čenkov (Holubičková et Kropáčová Veget. pom. okr. Štúrovo, p. 156, 1958).

Thalictrum minus L.

Žltučka menšia

Thalictrum minus L. Sp. pl. ed. 1, p. 546, 1753.

Trvacia 15–120 (–200) cm vysoká bylina. Podzemok krátky, vzácne plazivý, valcovitý, u nás bez výbežkov; korene vláknité. Stonka priama, oblá alebo ryhovaná až rebrenatá, holá zriedka na báze páperistá s ojedinelými žliazkami, okrem súkvetia nerozkonárená. Dolné až stredné stonkové listy troj až štvornásobne trojite perovito zložené; stopky prízemných listov väčšinou dlhé, stopky dolných stonkových kratšie, ryhované až oblé, pošvate, horné stonkové listy sediace alebo krátko stopkaté, hlavné lístkové stopky 3 ± rovnako hrubé a dlhé, v miestach rozkonárenia na lístkové stopky 2. stupňa niekedy malé šupinovité prílistky, lístky posledného stupňa stopkaté, len koncové ± sediace, vajcovité alebo obrátene vajcovité až okrúhle, vpredu trojlaločné až sedemlaločné, niekedy až trojite strihané, s úkrojkami