

a Havran (Fritze 1868 BP; Domin 1919 PRC; Domin et Krajina 1925 PRC; B. Pawłowski 1939 KRA). – Havran (B. Pawłowski l. c.). – Tristarská dolina (Kotula l. c. ut Bialý potok a pod Žlebina; Domin et Krajina 1925 PRC; Krajina 1928 PRC; Domin 1933 PRC; Futák et Opluštilová 1943 SLO; Osvačilová 1955). – Ždiarska vidla (Krajina 1924 PRC). – Dolina potoka Belá (Domin 1937 PRC). – Reglaný potok (Kotula l. c.). – Dolina potoka Babina (Kotula l. c.). – Jatky (Kotula l. c.). – Dolina Siedmich prameňov (Kotula l. c.). – Faixová (Futák 1954 SLO).

Thalictrum simplex L.

Žltuška jednoduchá

Thalictrum simplex L. Mantissa, p. 78, 1767.

Syn.: *Thalictrum simplex* L. 1753 p. p. non Jacq.

Rastlina 30–100 cm vysoká. Podzemok valcovitý, plazivý. Stonka priama, ryhovaná, jednoduchá, bohato olistená. Prízemné listy krátko stopkaté, za kvetu ± odumreté, stonkové sediace, trojuholníkovité, 2–3-krát perovito zložené, v obryse kopijovité, stopky ryhované, holé, pošvy úzke, uškáté, v miestach rozkonárenia listovej kostrnky obyčajne nie sú prílistky. Lístky dolných listov široko obrátene vajcovité až čiarkovité, na báze klinovite zúžené, vpredu dvojlaločné alebo trojlaločné, laloky s 2–3 zubmi alebo celistvookrajové, laloky horných listov úzko obrátene vajcovité až úzko čiarkovité, sediace, celistvookrajové alebo niekedy dvojlaločné až trojlaločné, na okraji niekedy podvinuté, na líci tmavozelené, na rube sivozelené, holé, veľmi vzácne na rube páperisté (žliazkaté sa na Slovensku doteraz nezistili). Metlina stiahnutá, pomerné úzka, s konármi krátkymi ± rovnako dlhými; listene úzko kopijovité až šidlovité alebo listového tvaru, ale menšie. Kvety na koncoch konárov nenakopené, najprv ovisnuté, neskoršie vzpriamené, stopky 3–10 mm dlhé; okvetné lístky 4, vajcovité, 3–4 mm dlhé, tyčiniek 11–15, previsnuté, žltkasté, zelené alebo fialkasté, s nitkami 2-krát dlhšími ako končisté peľnice s dlhým konektívom. Nažky v počte 6–12, sediace, vajcovité až široko elipsoidné, asi 2 mm dlhé, pozdĺžne rebernaté, so šípovitým zobáčikom.

Variabilita. Druh veľmi premenlivý, najmä pokiaľ ide o veľkosť a tvar lístkov, ich odenie, farbu a tvar nažiek. Pri hodnotení veľkosti, resp. šírky lístkov, treba brať zreteľ len na prostredné a horné listy, lebo prízemné listy (za kvetu obyčajne už odumreté) majú lístky vždy širšie, a to aj pokiaľ ide o formy, ktorých ostatné lístky sú čiarkovité. Stredoeurópske rastliny, ktoré zaraďujeme do tohto druhu, sa prv hodnotili ako druhy *T. simplex* L., *T. galioides* (DC.) Pers. a *T. bauhini* Crantz, resp. len prvým 2 sa ponechala druhová hodnota, prípadne len druhý sa hodnotil ako poddruh prvého druhu. V poslednom čase sa väčšinou hodnotia ako poddruhy druhu *T. simplex*. Pre prvé 2 taxóny bolo opísaných mnoho foriem, ktoré sa často vyskytujú v jednotlivých populáciách spoločne, bez vzťahu k zemepisnému rozšíreniu a charakteru stanovišta. Na základe štúdia značne bohatého herbárového materiálu a popu-