

Pannonicum. **2.** Lipovany, vrch Magoš. – Fiľakovské Kľačany, vrch „Halyos“ (obe lokality Holub 1972). – Hajnáčka (Májovský 1958 SLO). – Preseľany nad Ipľom, kóta 128 (Piesky) (Smejkal et Vicherek Zpr. Čs. bot. Spolec. 5: 51, 1970). – Šahy (Jasičová 1977 SAV). – Hodejov (Holub 1972; Jasičová 1977 SAV). **6.** Bratislava, Horský park (Opluštilová 1945 SLO). – Sintava, Dubník (Michalko 1957 SAV). – Tesárske Mlyňany (Svobodová, Řehořek, 1976). – Tekovské Nemce (Svobodová, Řehořek 1974). – Beša (Kováčová 1977). **8.** Rad – Svinica (Holub 1961).

Carpathicum. **14a.** Tekovská Breznica, pravá strana rieky Hron (Svobodová, Řehořek 1975). **15.** Muránska Dlhá Lúka (Májovský 1958).

Xanthoxalis corniculata (L.) Small

Kysličkovec rožkatý

Xanthoxalis corniculata (L.) Small Fl. southeast. Un. Stat., p. 667, 1903.

Bazionym: *Oxalis corniculata* L.

Jednoročná–dvojiročná alebo viacročná rastlina s priamymi niekedy poliehavými, zakoreňujúcimi, chlpatými stonkami. Chlpy odstávajúce alebo nadol smerujúce. Listy striedavé, tmavozelené, často s fialovým nádychom. Lístky obrátene vajcovité, na okraji chlpaté. Prílistky malé, podlhovasté, na vrchnej strane holé, na spodnej slabo chlpaté, na okraji brvité. Kvety v pazuchách listov v (1–) 2–6-kvetom súkvetí; kvetná stopka aj v čase plodu vzpriamená, pritlačená chlpatá; kališné lístky vajcovité, končité, chlpaté; lupienky obrátene vajcovité, na vrchole vykrojené, 4–6 mm dlhé, zlatožlté. Tobolka vzpriamená, valcovitá, päťhranná, pomerne husto krátko chlpatá, chlpy nadol smerujúce. Semená obyčajne so 6–8 rebrami, bez bielych pásov.

Chromozómy: $2n = 48$.

Biológia, ekológia. Terofyt. Kvitnutie jún–september. Rastie vo viniciach, záhradách, parkoch, skleníkoch, vzácné na poliach, hlavne na nížinách.

Rozšírenie na Slovensku. Nie je dostatočne známe a vyžaduje ďalšie štúdium. Máme iba niekoľko údajov o rozšírení v okresoch Burda – sedlo nad Kováčovskou dolinou (Domin 1929), Ipeľsko-rimavská brázda – Opatovská Nová Ves (Hendrych Acta Univ. Carol., ser. biol. 1: 38, 1964). – Fiľakovo (Pénzes 1944), Podunajská nížina – Jur pri Bratislave, Šúr (Domin 1921b: 92). – Pezinok, okolie (Holuby 1912c: 680).

V oblasti karpatskej flóry je tento druh doteraz známy iba z okresov Južné Biele Karpaty – Bošácka dolina (Holuby 1912: 680) a Stredné Pohornádie – Hradová (Krippelová Acta Insb. bot. Acad. Sci slov. 1974: 154), Ružín, Zadná hora (Domin 1931). Určite je však viacej rozšírený, najmä v oblasti panónskej kveteny.