

Carpaticum. **9.** Veľká Javorina, viacej lokalít (J. Knapp 1865b: 165; Holuby 1882 BP; Sillinger 1926 PR). – Lopeník (Holuby 1888b: 127). **13.** Skupina Rokoša, viac lokalít (Scheffer 1921; Futák 1947a: 176). – Strážov, viac lokalít (Holuby 1888b: 127; Scheffer 1930). – Čičmany, vrch Čelo (Scheffer 1930). **14c.** Kremnické Bane, Trnovník (Maloch 1920 PRC). **14e.** Banská Štiavnica (J. Knapp 1864a: 111; Kupčok Biol. Pr. SAV 2/9: 27, 1956). **15.** Fabova hoľa (Richter 1888a: 118; V. Vraný 1923 PRC; Hendrych Acta Univ. Carol., ser. biol. 2: 139, 1968). **16.** Viacej lokalít. **17.** Hrabušice, dolina rieky Hornád (Deyl 1938 PR). – Vernár – Popová (Wetschky 1878b: 225; Sillinger 1933a: 312). – Stratená – Dobšiná (Domin 1919). **18.** Branisko, sedlo medzi kótami 1043 a 1131 (Deyl 1938 PR). **21, 22, 23.** Vefa lokalít. **24.** Aksamitka (Futák 1970). **26a.** Liptovská Teplá W (Urvichiarová 1972). – Ižipovce, E. od vrchu Mníchov (Urvichiarová 1972). **26b.** Pozdĺž rieky Poprad (Walas 1939). **27a.** Skupina Vršatca, Zvánova hora N (Fajmonová 1965). – Kobylínáč a hrebene medzi dolinami Továrskeho a Hromádkovho potoka, viac lokalít (Fajmonová 1967). **27b.** Viacej lokalít. **28.** Minčol. – Kubínska hoľa. – Pod kótou 1303. – Jaloviarka. – Pilsko. – Babia hora. **31.** Kóta 1199, E od vrchu Ďurkovec. – Rabia skala. – Čelo. – Stinka.

Nesprávny údaj: **8.** Kopce pri obci Viničky (Margittai 1933c: 54). Ide zrejme o *G. sanguineum*.

Pochybné údaje: **10.** Záruby. – Veterlín. – Čierna skala (Nevole 1931: 76).

Geranium phaeum L.

Pakost hnedočervený

Ic.: Tab. 53, fig. 2, p. 485

Geranium phaeum L. Sp. pl. ed. 1, p. 681, 1753.

Rastlina trváca. Podzemok hrubý, vodorovný, pokrytý zvyškami hnedých príliskov. Stonka priama, 30–60 cm vysoká, v hornej časti ± rozkonárená, červenkastá, husto, najmä v hornej časti, odstávajúco dlho chlpatá a drobno žliazkato páperistá. Prízemné listy dlho stopkaté, okrúhlasto obličkovité, dlaňovito päťzázrezové až sedemzázrezové alebo laločnaté, na vrchnej strane pritlačeno chlpaté, na spodnej chlpaté iba na žilách, inde ± holé. Úkrojky nepravidelne kosoštvorcové, nerovnako hrubo zubaté. Stonkové listy striedavé, krátko stopkaté, smerom k vrcholu stonky sa zmenšujú, najvyššie trojdielne. Prílisky vajcovito kopijovité, červenohnedé, na chrbtovej strane dlho chlpaté. Súkvetie dvojramenný vrcholík. Kališné lístky vajcovité alebo podlhovasté, zakončené malým hrotom, dlhé asi 8 mm, trojžilové, žliazkato aj štetinkato chlpaté. Lupienky okrúhlasto obrátene vajcovité, ploché, na okraji nezvlnené alebo veľmi slabo až silno zvlnené, na báze zúžené do veľmi krátkeho nechtíka, 2-krát dlhšie ako kališné lístky, červenohnedé, čiernofialové alebo špinavolilavé, jemne chlpaté. Nitky tyčínik na báze rozšírené, dlho chlpaté. Plody v hornej časti priečne vráskovité, štetinkaté. Semená elipsoidné, holé, takmer hladké, s jemnou sieťovitou skulptúrou.

Chromozómy: $2n=28$, okr. 23c, Zadné Medodoly (Uhríková in: Májovský et al., Acta Fac. Rer. natur. Univ. Comen., ser. bot. 18: 53, 1970).