

Biológia, ekológia. Terofyt. Kvitnutie máj–september. Rastie na nížinách a pahorkatinách v záhradách, na poliach, v suchších trávnatých porastoch, kriacínach a inde.

Rozšírenie na Slovensku. Nie je dostatočne známe. Z panónskej oblasti máme niekoľko údajov o výskyte z okresov Burda, Ipeľsko-rimavská brázda, Slovenský kras, Záhorská nížina, Devínska Kobyla a Podunajská nížina. V oblasti západokarpatskej flóry je doteraz známy ojedinelý výskyt z okresov Južné Biele Karpaty, Trábeč, Strážovské vrchy, Slovenské rudohorie, Muránska planina, Vihorlat, Spišské kotliny a Severné Biele Karpaty.

Pannonicum. 1. Kamenica nad Hronom. – Vrch Burda, úpätie (obe lokality Domin 1929). 2. Filakovo, hrad (Domin 1933). – Rimavská Sobota, okolie mesta (Fábry 1867: 82). 3. Turnianska planina (Domin 1919). 4. Zohor – Lozorno. – Rohožník. – Lakšárska Nová Ves (všetky lokality Degen, Gáyer et Scheffer 1923: 91). – Hlboké (Černoch 1951). – Kuchyňa – Plavecký Štvrtok (Domin 1929). 5. Devínska Kobyla S, SW (Kaleta Acta Rer. natur. Mus. nat. slov., Bratislava 14/1: 47, 1968). 6. Bratislava, okolie (Lumnitzer 1791: 296). – Hlohovec, Soroš (Feráková Acta Fac. Rer. natur. Univ. Comen., ser. bot. 20: 153, 1972).

Carpathicum. 9. Zemianske Podhradie (Holuby 1869a: 931). 10. Kuchyňa, nad zámočkom Vývrat (Černoch 1957). – Lozorno, dolina potoka S od vrchu Somár (B. Slavík Zpr. Čs. bot. Společ. 1: 149, 1966). 12. Čeladince, vrch Hradovička (Kováčiková 1974). 13. Trenčín, hrad (Brancsik 1899a: 160). – Súľov (Feráková 1972). 15. Galmus, Rudňany (Hajdúk Biol. Pr. SAV 9/10: 34, 1963). 16. Tisovec, Čeremošná (V. Vraný 1929; Hendrych Acta Univ. Carol., ser. biol. 1968/2: 173, 1969). – Furmanec. – Kačkava. – Muráň. (všetky lokality Hendrych l. c.). 20. Krivošćanka (Buček 1932: 89). 27a. Vršatec, zrúcanina hradu (Fajmonová 1963).

Geranium pusillum Burm. fil.

Pakost nízky

Ic.: Tab. 55, fig. 3, p. 498

Geranium pusillum Burm. fil. Spec. bot. Geran., p. 27, 1759.

Rastlina jednoročná až dvojročná. Stonka 8–40 cm vysoká, vystúpavá alebo rozprestretá, oblá, často už od dola rozkonárená, krátko odstavajúco chlpatá, hore aj žliazkatá, v dolnej časti neskôr lysá. Prízemné a dolné stonkové listy dlho stopkaté, čepeľ okrúhla, 2–4 cm v priemere, dlaňovito 5–7 (–9)-dielna, diely obrátene vajcovité alebo podlhovasto klinovité, na vrchole často tupé alebo tupo končité, trojlaločné. Stonkové listy protistojné alebo zdanlivo striedavé, vyššie stále kratšie stopkaté až skoro sediace, s čepeľami hlboko delenými, väčšinou päťdielnymi. Prílistky malé, kopijovité, brvité. Súkvetie dvojvetvé vidlice. Stopky súkvetia dlhšie ako stopky podporných listov, krátko chlpaté a žliazkaté. Kvetné púčiky sklonené. Kvety malé, nenápadné. Kališné listy vajcovité, 3–4 mm dlhé, na okraji blanité, na