

- 2a Listy slabolaločné . . . . . *E. malacoides*  
 2b Listy perovito dielne až perovito strihané . . . . . *E. cicutarium*  
 3b Stredná žila listovej čepele so zúbkatým alebo laločnatým zvyškom čepele . . . . . *E. ciconium*

*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.

Bocianik rozpukovitý

Ic.: Tab. 54, fig. 1, p. 493

*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Ait. Hort. Kew. 2: 214, 1784.

Bazionym: *Geranium cicutarium* L. Sp. pl. ed. 1, p. 680, 1753.

U nás len subsp. *cutarium*

Jednoročná až dvojočná nepríjemne zapáchajúca bylina s tenkým alebo hrubším málo rozkonáreným kolovitým koreňom. Stonky jednotlivé alebo početné, 5–50 (aj viac) cm vysoké, priame, vystúpavé alebo poliehavé, často skrútené (najmä pri exemplároch prezimujúcich a kvitnúcich na jar alebo na jeseň), roztrúsene až husto chlpaté, v hornej časti niekedy aj žliazkaté. Prízemné listy v ružici, početné, stonkové protistojné, smerom nahor sa znižujúce. Listové stopky chlpaté, čepele veľmi mnohotvárne, v obryse podlhovasté alebo elipsovité, nepárno perovito strihané alebo perovité, horné často iba perovito laločné, na oboch stranách štetinkaté a žliazkaté. Segmenty 2–5 na každej strane, hlboko často 2-krát perovito dielne, dielky čiarokovité, kopijovité, končisté. Vrcholový segment trojdielny. Súkvetie trojkveté až osemkveté okolíky. Kvetné stopky spočiatku sklonené, neskôr vzpriamené, chlpaté podobne ako stopka súkvetia. Kališné lístky elipsovité, podlhovasté, na okraji blanité, na vrchole krátko končisté, žliazkato chlpaté, trojžilové až päťžilové. Lupienky obrátene vajcovité, všetky rovnako alebo 2 väčšie, 4–10 mm dlhé, až 2-krát dlhšie ako kališné lístky, ružové, svetlokarmínové, ružovofialové, vzácné biele, 2 väčšie na báze s purpurovou škvrnou, všetky nad bázou chlpaté. Z tyčínok iba 5 vnútorných plodných. Plody úzko obrátene vajcovité, štetinaté. Zobáčik plôdika v dolnej časti skrútkovito stočený, aj na vnútornej strane pritlačene dlho chlpatý.

Chromozómy:  $2n = 40$ , okr. 6, Jur pri Bratislave, Šúr (Garajová in: Májovský et al., Acta Fac. Rer. natur. Univ. Comen., ser. bot. 16: 10, 1970).

Variabilita. Veľmi premenlivý. Štúdium variability je značne komplikované, pretože znaky sa rôzne kombinujú a predjarné a jesenné formy sa habitom veľmi líšia od jarných, resp. letných foriem. V populáciách na našom území je veľa nápadne rozdielných typov, ktoré však ťažšie možno hodnotiť vyššie ako variety a možno ich zhrnúť do 1 poddruhu: subsp. *cutarium*. Domin (1936m) napr. uvádza z Burdy,