

patskej oblasti, pre ktorú je endemickým druhom (ako vikariant východoalpského druhu *G. austriaca*). Často chybne určovaný (zámena s *G. lutescens*), preto údaje o rozšírení a mapka je vypracovaná iba na základe študovaných herbárových materiálov.

Carpathicum. 13. Uhrovec, Holý vrch (Schidlay 1969 SAV). — Uhrovecké Podhradie, zrúcanina hradu (Futák 1961 SAV). — Kanisova skala a okolie (Futák 1960 SAV; J. Šmarda 1960 BRNU; Holub 1967). — Rokoš (Schidlay 1936 SAV; Pokluda 1970 BRNM). — Rajecké Teplice, vápenkové skalky (Domin 1919 PRC). 21a. Kláštor pod Znievom, Hradný kopec (Margittai 1907 BRA). 21b. Dosť často. 21c. Hojne rozšírený s výnimkou severnej časti. 21d. Šíp. — Predný Choč. — Veľký Choč. — Lúčky — Choč. — Valaská Dubová — Choč. — Prosiecka dolina. — Biela skala. — Biela skala — Sivý vrch. 22. Salatin (J. Šmarda 1934 BRNU; Hubová 1972 SAV). — Demänovská dolina (Petrželková 1964 BRA). — Poludnica (Hrebětová 1954 BRNU). — Krakova hoľa (Sillinger 1931 PRC; Weber 1953 BRNM). — skupina Ohnišťa (Sillinger 1930 PRC; J. Šmarda 1955 BRNU). 23a. Hájovňa Brestová (Futák 1957 SAV). — Mačacie diery (Medovič 1977 BRA). — Osobitá (Jávorka 1911 BRA, BRNU; Jos. Dostál et F. A. Novák 1935 PRC). — Juráňova dolina (Futák 1957 SAV).

Gentianella lutescens (Velen.) J. Holub

Horček žltkastý

Gentianella lutescens (Velen.) J. Holub Folia Geobot. Phytotax. (Bohemoslov.) 2: 117, 1967.

Bazionym: *Gentiana lutescens* Velen. Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk 1888: 29, 1889.

Syn.: *Gentiana praecox* sensu auct. non sensu A. et J. Kerner orig. — *Gentiana polymorpha* Wettst. — *Gentiana carpatica* Wettst. non Kit. ap Schultes

Dvojočná, 5—45 cm vysoká bylina. Byl priama, jednoduchá alebo úzko rozkonárená, bočné konáre krátke, dolné vystúpavé, horné vzpriamené až priamo odstávajúce. Habitus rastliny valcovitý. Prízemné listy lopatkovité až obrátene vajcovité, tupé. Stredné byľové listy sediace, úzko podlhovasto obrátene vajcovité, tupé alebo vajcovité až vajcovite kopijovité, končisté, holé, obyčajne kratšie ako stonkové články jedno—, troj— až päťžilové. Súkvetie úzka metlina, zložená z málokvetých párových strapcov, niekedy redukované na niekoľko málo kvetov v pazuchách najvyšších listov. Kvety (20—) 22—30 (—32) mm dlhé. Kališná rúrka nekrídlatá, kališné zuby pretiahnute až trojuholníkovite čiarkovité, ploché, na okraji ± podvinuté, rovnako dlhé ako kališná rúrka. Zárezy medzi kališnými zubmi zaokrúhlené, niekedy ostro zárezové. Koruna lilavá, biela alebo žltkastá. Nitky ± do 1/2 prirastené ku korunnej rúrke, voľná časť nitiek nerozšírená alebo iba slabo krídlatá. Peňnice 1,2—1,5 mm dlhé, nafialovelé. Semenník stopkatý (stopka 0,5—1,5 mm dlhá), valcovitý, na vrchu zúžený do krčka, 2—3 cm dlhý, o málo dlhší ako korunná rúrka. Semená ca 0,8 mm dlhé, okrúhlo vajcovité, úplne hladké, tmavo slamovožlté.

Chromozómy: 2n =

Nomenklatorická poznámka. *G. lutescens* sa dlhý čas uvádzal v našej literatúre pod menom *Gentiana praecox* A. et J. Kerner, opísaný z Jauerlingu v Dolnom