

111, 114). — Kopčany (Krzisch 1857: 59). — Holíč (Krzisch l. c.). — Skalica (Krzisch l. c.; Záborský 1956 SLO). **6.** Viac lokalít. **7.** Paňovce, okolie (Krippelová Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov. 2: 81, 1974). — Košice (Thaisz 1909 BP). **8.** Slovenské Nové Mesto. — Borša (Domin 1932). — Ladmovce — Zemplín (Záborský 1962). — Rad, Hrušov (Májovský 1960). — Kráľovské kopce (Záborský 1960). — Kráľovské kopce, Vysoká (Domin 1937k: 106). — Kráľovské kopce, Nízka (Domin l. c., p. 105). — Černochovej, Čierna hora (Domin 1932). — Trňa, Malá Trňa (Futák 1949). — Pavlovce nad Uhom, les Sekera (Berta Waldgesellsch. Bodenverhältn. Theisstief. tab. 48, 1970).

Carpaticum. **9.** Bošáca (Holuby 1886 BRA). **10.** Bratislava, viac lokalít (Lumnitzer 1791: 118; Opluštilová 1948 SLO). — Bratislava — Vinosady, viac lokalít. — Čachtice (E. Keller 1866: 210). **11.** Marhát (Domin 1931). — Marhát — Bielený vrch (Joh. Hruby 1942: 130). — Dolina (Joh. Hruby l. c., p. 131). **13.** Trenčín, hrad (Brancsik 1898 BRA). **14d.** Zvolen (Freyn 1872: 346; Trapl 1923 PRC). **14e.** Krnišov (Kmeť 1876, 1881 BRA). — Banská Štiavnica (Cserey 1892 BRA). **15.** Medzev (Pulchart 1948 PRC). — Košice NW, kopec Blis (Šmídt 1973). **19.** Rankovce, Malé Brdo (Thaisz 1910 BP). **20.** Vinné, Kecerovská (Dietz 1883: 183). **21a.** Vyšehrad (J. Wagner 1901a: 30). **21c.** Lubochňa (Borbás 1898 BPU). **22.** Moštenica (Kmoniček 1931 PRC). — Lučatín (Trapl 1922 PRC). **24.** Holica (Osvačilová 1950 PRC). **25.** Budiš (J. Wagner l. c.). — Kláštor pod Znievom (Margittai 1910: 278). — Belá (Textorisová 1924 PRC). — Sklabiňa (Jurko Biol. Pr. SAV 10/6: 64, 1964). **26.** Viac lokalít. **28.** Oravský Podzámok (Wahlenberg 1814: 86; Szontagh 1863: 1080). **30a.** Ruská Nová Ves (Jurko l. c.). — Šarišský hrad (Májovský 1949 SLO). — Brezovica nad Torysou, Homôlka (Margittai 1937b: 108).

### *Chaerophyllum temulum* L.

#### Krkoška mámivá

*Chaerophyllum temulum* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 258, 1753.

Syn.: *Chaerophyllum temulentum* L.

Jednoročná až dvojročná bylina. Koreň tenký, vretenovitý. Stonka 30—100 cm vysoká, ± ryhovaná, pod uzlami trochu zhrubnutá, často fialovo škvrnitá, na báze pokrytá bielymi, naspät ohnutými štetinami. Listy dvojite až trojite perovito strihané, sivozelené, často hnedočierne škvrnité, pritlačene štetinato chlpaté. Dolné listy stopkaté, horné na pošvách sediace. Segmenty v obryse vajcovité až vajcovito podlhovasté, na vrchole tupé, na báze laločnato zárezové. Segmentíky v obryse vajcovité, na okraji hrubo pílkovité, na vrchole špičkaté. Zložený okolík pred rozkvitnutím ± ovisnutý, so 6—12 okoličkami. Stopky okoličkov drsné. Obal často chýba. Obalčeky z 5—8 kopijovitých, husto a jemne brvitých listencov. Lupienky biele alebo červenkasté, vzácné žltkasté. Plody (Ic.: Tab. 18, fig. 8, p. 174) 4—7 mm dlhé, v zrelosti žltohnedé.

Chromozómy:  $2n = 14$ , okr. 10, Bratislava, Červený most (Uhríková in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 26: 21, 1978).

Biológia, ekológia, fytoecológia. Hemikryptofyt. Kvitnutie máj—júl. Nitrátofilná lesná burina. Rastie na vlhkých, na dusík bohatých pôdach, na antropo-