

- 3a Stonka holá alebo len v dolnej časti mäkko chlpatá. Koreň sa po poranení ne-  
sfarbuje . . . . . *P. saxifraga*  
3b Stonka husto chlpatá alebo huňatá, dlho srstnatá, vzácne lysavejúca. Koreň po  
poranení vylučuje modrasté mlieko. . . . . *P. nigra*

*Pimpinella major* (L.) Hudson

Bedrovník väčší

*Pimpinella major* (L.) Hudson Fl. Angl. ed. 1, p. 110, 1762.

Bazionym: *Pimpinella saxifraga* L.  $\gamma$  *major* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 264, 1753.

Syn.: *Pimpinella magna* L. — *P. saxifraga* L. subsp. *magna* (L.) Bonnier

Trváca, 40—100 cm vysoká, holá alebo vzácne páperistá bylina, v čase kvitnutia so sterilnými, bočnými ružicami listov. Koreň vretenovitý, rozkonárený, svetlý. Stonka hranatá, hlboko ryhovaná, spravidla dutá, rozkonárená. Bazálne listy jednoducho až trojite perovito strihané. Segmenty vajcovité až podlhovasté, na okraji pílkovité, vzácne perovito zárezové, až 7 cm dlhé. Stonkové listy užšie, s nafúknutou, belavo lemovanou pošvou. Zložený okolík s 10—30 okolíčkami. Obal a obalčky spravidla chýbajú, len vzácne z niekoľkých opadavých listeňov a listencov. Lupienky biele, ružové, tmavoružové až červené. Čnelky po odkvitnutí dlhšie ako mladé visiace dvojnažky. Plody (Ic.: Tab. 21, fig. 22, p. 220) vajcovite podlhovasté, 2,5 — 3,5 mm dlhé, zrelé s belavými rebrami.

Biológia, ekológia. Hemikryptofyt. Kvitnutie jún—júl. Rastie na sviežich, na živiny, najmä na vápnik a dusík bohatých hlbších pôdach v lesoch, lesných lemoch, na lúkach v spoločenstvách radov *Fagetalia*, *Prunetalia*, *Festucetalia valesiaca* a *Seslerietalia calcariae*, ako aj v spoločenstvách zväzov *Arrhenatherion* (subsp. *major*) a *Trisetopolygonion bistortae* (subsp. *rhodochlamys*) od planárneho do subalpínskeho stupňa.

Kľúč na určenie poddruhov

- 1a Kveti biele, veľmi vzácne bledoružové, stonka vysoká, len v hornej časti rozkonárená . . . . . subsp. *major*  
1b Kveti tmavoružové až červené, stonka nízka, od bázy rozkonárená . . . . .  
. . . . . subsp. *rhodochlamys*