

et Scheffer l. c.). — Velké Leváre (Degen, Gáyer et Scheffer l. c.; Bosáčková Pr. a Štúd. Čs. Ochr. Přír. Bratislava 2/1: 51, 1970). — Holíč (Krzisch 1857: 56). 6. Mnoho lokalít. 7. Čečejevce (Lengyel l. c.). 8. Kráľovský Chlmec, jazero „Nagyibolyás“ (Margittai 1929d: 93). — Ptrukša (Gallo 1968 SAV).

Carpaticum. 9. Myjava (Holuby 1866: 376). — Stará Turá (Holuby l. c.). — Bzince (Holuby l. c.). — Štvrtok (Holuby 1865h: 267, 1881 PRC, 1887 BRA). 10. Plavecké Podhradie (V. Nábělek 1935 BRA). — Častá (Zigmundík 1913 BRA). — Dobrá Voda, Mariánska kaplnka (Domin 1931). — Dobrá Voda, pri prameni Vítek (Feráková in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 25: 3, 1976). 13. Uhrovské Podhradie (Domin 1930). — Dobrá (Holuby 1874f: 321). — Rajecké Teplice (Borbás 1898 BPU, 1900b: 263). 14b. Horné Hámre (Kmeť 1876 BRA). — Prochoťská dolina (Tuzson 1907 BPU). 14e. Prenčov, Lúčka (Kmeť 1890 BP). — Banská Štiavnica, štólňa Gedeon (Cserey 1890 BRA). 21d. Ružomberok, pod Čebraťom (Lányi 1907 BP). 25. Kláštor pod Znievom (J. Wagner 1901a: 28). — Příbovce — Blatnica (Domin 1920). — Martin (Kmeť 1907 BRA). 27a. Trenčín, Sihot (Brančík 1898 BRA). — Lednické Rovne (Rochel 1806 BPU). — Mestečko — Lysá pod Makytou (Viselková 1969). 30a. Prešov (Hazslinszky BP).

Libanotis Zinn

Rebrica

(spracovali A. Hlavaček, M. Jasičová, K. Zahradníková)

Libanotis pyrenaica (L.) Bourgeau

Rebrica pyrenejská

Ic.: Tab. 24, fig. 1, p. 244

Libanotis pyrenaica (L.) Bourgeau Fl. Pyr. Hisp. p. 562, 1879.

Bazionym: *Crithmum pyrenaicum* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 246, 1753.

Syn.: *Athamantha libanotis* L. — *Libanotis montana* Crantz — *Seseli libanotis* (L.) Koch — *Libanotis daucooides* Scop.

Dvojročná až trváca, 30—120 cm vysoká bylina. Podzemok šticatý. Stonka priama, hlboko ryhovaná, holá alebo páperistá. Dolné listy dlho stopkaté, jednoducho až trojite perovito strihané, v obryse podlhovasto vajcovité, horné pošvami sediace, menšie. Zložený okolík s 20—40 okolíčkami, stopky okolíčkov hranaté, na vnútornej strane páperisté, po dozretí plodov dovnútra ohnuté. Listeňov obalu 8 alebo viac, kopijovité, 5—15 mm dlhé, brvité. Obalččky z 10—15 čiarkovitých listencov. Kvety kratšie ako listence obalčkov. Kališné zuby čiarkovité až vajcovite kopijovité. Lupienky okrúhlasto vajcovité, 1 mm dlhé, biele alebo ružovkasté. Plody (Ic.: Tab. 23, fig. 9, p. 238) vajcovité až elipsoidné, 2,5—4 mm dlhé, 1,5—2,5 mm široké.