

subsp. *intermedia* (Rupr.) Soó

Rebrica pyrenejská prostredná

*Libanotis pyrenaica* (L.) Bourgeau subsp. *intermedia* (Rupr.) Soó Acta Biol. Acad. Sci. Hung. 3/2: 227, 1952.

Bazionym: *Libanotis intermedia* Rupr. Distrib. Petropol., p. 53, 1845.

Syn.: *Libanotis montana* Crantz subsp. *sibirica* (Thell.) Dostál — *Seseli libanotis* (L.) Koch subsp. *intermedia* (Rupr.) P. W. Ball

Dolné listy jednoducho perovito strihané, segmenty široko vajcovité, na okraji hrubo zúbkaté až perovito zárezové, široké, na vrchole tupé. Obal ± zakrpatený.

Chromozómy:  $2n =$

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 44. Je doteraz nedostatočne známe. Vyžaduje ďalšie štúdium.

Pannonicum. 4. Skalica, Veterník (Weber 1925 BRA).

Carpathicum. 14e. Banská Štiavnica, svah Starého mesta NW (Hlavaček 1936). 21d. Choč, „Žrela“ (Vávra 1932 BRA). 24. Vrch „Grabzicha“ (Degen 1905 BP). — Holica (Májovský 1953 SLO). 26b. Lučivná (1933 BRA).

## Seseli L.

### Sezel

(spracovali A. Hlavaček, M. Jasičová, K. Zahradníková)

Jednoročné až trváce, holé byliny. Stonky oblé, jemne ryhované. Listy v obryse trojuholníkovité, trojite až štvornásobne perovito strihané, segmentíky čiarkovité až vláknité. Obaly zväčša chýbajú, obalčky vyvinuté, zrastené alebo voľné. Kališné zuby krátke, tupé alebo končisté. Lupienky obrátene srdcovité alebo široko elipsoidné až srdcovite vajcovité, na vrchole vyštrbené, biele, zvonku často červenkasté. Plody vajcovité alebo podlhovasto elipsoidné až obrátene vajcovité, plôdiky s 5 hrubými rebrami.

### Kľúč na určenie druhov

- 1a Listence obalčeka skoro po celej dĺžke golierikovite zrastené . . . . . *S. hippomarathrum*  
 1b Listence obalčeka voľné, nanajvyš len na báze zrastené . . . . . 2  
 2a Stopky okolíčkov na vnútornej strane alebo dookola páperisté . . . . . 3  
 2b Stopky okolíčkov holé . . . . . 4  
 3a Stopky okolíčkov na vnútornej strane páperisté, okraje listencov obalčeka brvité  
 . . . . . *S. annuum*