

Pochybný druh

Seseli austriacum (G. Beck) Wohlf. in Koch Syn. Deutsch. Fl. ed. 3, p. 1072, 1895.

Bazionym: *Seselinia austriaca* G. Beck Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 41: 799, 1891.

Syn.: *Seseli osseum* Crantz subsp. *austriacum* (G. Beck) Thell. — *S. elatum* L. subsp. *austriacum* (G. Beck) P. W. Ball

Podobný druhu *Seseli osseum*, od ktorého sa líši počtom okoličkov v zloženom okolíku (9—20), segmentíkmi listov 0,5—1 mm širokými a plodmi za mlada husto, za zrelosti len v žliabkoch pomúčenými. Rebrá plôdikov ± ploché, so zaobleným vrcholom. Medzi jednotlivými rebrami 2—4 silicové kanáliky.

Rozšírenie na Slovensku. Z juhozápadného Slovenska ho udáva Jos. Dostál (Kvĕtena ČSR, p. 1043, 1949, Klíč ed. 2: 450, 1958). Položky z tohto územia sú *Seseli osseum*. Výskyt druhu si vyžaduje ďalšie štúdium.

Phellandrium L.

Haluchovka

(spracovala L. Bertová)

Phellandrium aquaticum L.

Haluchovka vodná

Ic.: Tab. 25, fig. 1, p. 255

Phellandrium aquaticum L. Sp. Pl. ed. 1, p. 255, 1753.

Syn.: *Oenanthe phellandrium* Lam. — *Oenanthe aquatica* Poiret

Jednoročná až dvojročná, (30—) 50—150 (—200) cm vysoká, holá bylina. Korene tenké, netvoriace hľuzy. Stonka priama alebo plazivá, na uzloch zakoreňujúca, dutá, ryhovaná, rozkonárená, na báze až 8 cm hrubá. Listy dvojite až pätnásobne perovito strihané. Pošvy odstávajúce od listových stopiek. Segmenty ponorených listov úzko a dlho čiarkovité, ostatné so segmentmi podlhovastými, končistými alebo vajcovitými, tupými. Kvety stopkaté a fertílné, len kvety, ktoré sa neskoro vyvinú, sterílné. Okolíky s 5—15 okoličkami. Obal chýba alebo z 1—3 listenôv, listence obalčekov kopijovité. Kališné zuby 0,5—1 mm dlhé, za zrelosti plodov zreteľne kratšie ako stylopódium. Lupienky široko obrátene srdcovité, do 1/3 zastrí-

Tab. 25. — 1: *Phellandrium aquaticum* L., horná časť rastliny so súkvetím, detail kvetov, detail plodu — 2: *Oenanthe silaifolia* Bieb., subsp. *silaifolia*, koreň, prostredný list, detail okolička, detail kvetu, detail nezrelého plodu.