

až 30 cm dlhé, dvojite až trojite perovito strihané, segmentíky čiarkovite kopijovité alebo čiarkovité, na okraji ostro pílkovité, na vrchole končisté, 5—10 cm dlhé. Zložený okolík s 10—20 okoličkami, stopky okoličkov 1—5 cm dlhé. Obal chýba, vzácne z 1—2 čiarkovitých listeňov. Obalčeky zo 6—8 čiarkovite podlhovastých listencov. Okoliček s 30—50 kvetmi. Kvety drobné, najviac 1 mm dlhé, biele. Plody (Ic.: Tab. 21, fig. 17, p. 220) ± guľovité, 1,7—2 mm dlhé, 1,5—1,7 mm široké, s 5 úzkymi rebrami.

Chromozómy: $2n = 22$, okr. 8, Poľany (Činčura et Hindáková in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 14: 201, 1967).

Biológia, ekológia, fytoecenológia. Hydatofyt, helofyt. Kvitnutie júl—august. Rastie na brehoch stojatých vôd, na mokrých, výživných, nevápnitých pôdach v planárnom a kolínnom stupni, vzácne vyššie. Maximum: ca 750 m n. m., okr. 22, Kráľova hoľa, úpätie (Trapl 1923 PRC). Vyskytuje sa najmä v spoločenstvách zväzov *Magnocaricion elatae* a *Phragmition communis*.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 57. V panónskej oblasti rastie hojnejšie v južnej časti Východoslovenskej nížiny. Vzácne až ojedinele sa vyskytuje v Slovenskom krase, Záhorskej a Podunajskej nížine. Z Ipelsko-rimavskej brázdy nie je nijaký údaj. V karpatskej oblasti je veľmi vzácny. Známy je z Južných Bielych Karpát, zo Slovenského rudohoria, z Nízkych Tatier, Západných Beskýd a Spišských vrchov.

Pannonicum. 3. Plešivec (Jos. Dostál 1933b: 37). 4. Čáry (Krzisch 1857: 55). — Kúty (Krzisch l. c.). — Skalica (Holuby 1865a: 86). 6. Bratislava, Petržalka, Pečenské rameno (Lumaitzer 1791: 116; Holuby 1871 SLO; Mergl 1901 SAV). — Bratislava, Petržalka, Starý háj (Votavová 1975). — Jur pri Bratislave, Šúr (Kornhuber 1858: 32; Domin 1921b: 91). — Očkov (J. Knapp 1865b: 145). — Galanta NE (Joh. Hruby 1942: 108). 8. Mnoho údajov, najmä z južnej časti.

Carpathicum. 9. Trenčín, ostrovy Váhu (Szontagh 1864: 274). 15. Kamenný potok — Myslavský potok — Vrbica (Šmíd 1973). 22. Kráľova hoľa, úpätie (Trapl 1923 PRC). 28. Bory, rašelinisko (Szontagh 1863: 1079). 29. Plaveč (Hazslinszky 1864a: 161, 1866 PRC; Jermy BP).

Zaniknutá lokalita. 28. Bobrov — Slanica (Holub 1951 PRC).

Falcaria Fabr.

Kosáčik

(spracovali A. Hlavaček, M. Jasičová, K. Zahradníková)

Falcaria vulgaris Bernh.

Kosáčik obyčajný

Falcaria vulgaris Bernh. Syst. Verz. Erfurt, p. 176, 1800.

Syn.: *Sium falcaria* L. — *Falcaria rivini* Host — *Falcaria sioides* (Wibel) Ascherson

Jednoročná až trváca, 30—90 cm vysoká, holá, sivozelená bylina. Stonka priama, rozkonárená, oblá, jemne ryhovaná. Listy tuhé, sivozelené, bazálne listy jednoduché