

Trváca, 10—50 cm vysoká, holá bylina. Koreňová hlava husto šticatá. Stonka vzpriamená, málo rozkonárená, na báze jemne ryhovaná, v hornej časti hranatá, dutá. Bazálne listy dlho stopkaté, pošváté, čepele v obryse trojuholníkovité, 5—10 cm dlhé, dvojite až trojite perovito strihané, segmenty čiarkovite kopijovité, 3—5 mm dlhé, na vrchole hrotité. Zložený okolík so 7—10 okoličkami. Obal chýba alebo len z 1—2 zväčša odstávajúcich alebo naspät ohnutých opadavých listenov, obalčky aspoň z 3 alebo viacerých kopijovitých listencov. Kališné zuby nezreteľné, lupienky elipsovité alebo obrátene vajcovité, 1—1,5 mm dlhé, biele, ružovkasté alebo červenkasté. Plody (Ic.: Tab. 23, fig. 20, p. 238) vajcovite podlhovasté, 4—6 mm dlhé, hladké, hnedasté so svetlejšími rebrami, holé.

Chromozómy: $2n = 22$, okr. 23c, Zadné Medodoly (Uhríková in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 26: 28, 1978).

Biológia, ekológia, fytoecológia. Hemikryptofyt. Kvitnutie jún—august. Rastie na vlhkých, hlbších a skeletových humózných pôdach na vápencovom aj silikátovom substráte, na holiach, okrajoch kosodreviny a vo vysokobylinných porastoch horských nív, v spoločenstvách zväzov *Nardion*, *Festucion pictae*, *Poion alpinae*, *Salicion herbaceae*, *Pinion mughi*, *Calamagrostion villosae* a *Adenostylon*, v subalpínskom a alpínskom stupni, vzáčne nižšie. Minimum: ca 625 m n. m., okr. 26b, dolina rieky Poprad medzi obcami Kežmarok a Spišská Belá (Domin et Krajina 1925 PRC). Maximum: 2610 m n. m., okr. 23b, Ladový štít (Paclová Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 19: 266, 1971).

Rozšírenie na Slovensku. V karpatskej oblasti sa vyskytuje najmä v centrálnych Karpatoch, ojedinele v Spišských kotlinách. Roztrúsene rastie v Západných Beskydách a Spišských vrchoch.

Carpaticum. 21, 22, 23. Hojne. 26b. Spišská Belá, dolina Popradu — Kežmarok (Domin et Krajina 1925 PRC). — Rakúsy, Veľký les (Futák 1946 SLO). 28. Kubínska hoľa (Deyl 1951 PR; Grebenščíkov 1954 SAV). — Pilsko (Peter 1878 PRC). — Babia hora (Kitaibel sec. Kanitz 1862—1863: 101; Degen 1904 BP; Májovský 1969 SLO). 29. Ždiarska Javorina, kóta 1216 m (Grodzińska Fragm. Florist. Geobot. 10/4: 437—452, 1964).

Conioselinum Hoffm.

Šabrina

(spracovali A. Hlavaček, M. Jasičová, K. Zahradníková)

Conioselinum tataricum Hoffm.

Šabrina pošvátá

Conioselinum tataricum Hoffm. Gen. Umb. ed. 2, p. 185, 1816.

Syn.: *Conioselinum vaginatum* (Sprengel) Thell. — *C. fischeri* Wimmer et Grab.