

často trojzázovové, listence obalčekov početné, čiarkovite kopijovité, dolu ohnuté, chlpaté. Kališné zuby kopijovité, lupienky biele alebo zvonku červenkasté, holé. Plody (Ic.: Tab. 31, fig. 15, p. 337) 8—10 mm dlhé, elipsoidné, bočné rebrá plôdikov 1,5—3 mm široké, širšie ako chrbové.

Chromozómy: $2n =$

Biológia, ekológia, fytoecológia. Hemikryptofyt. Kvitnutie júl—august. Rastie pozdĺž horských potokov a bystrín. na nivách a sutinách v montánnom stupni. Maximum: 1390 m n. m., 21c, Klak (J. Wagner 1891 BP). Vyskytuje sa v spoločenstvách zväzu *Adenostyliion*.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 67. Rastie ojedinele až vzácne v karpatskej oblasti v okresoch Strážovské vrchy, Muránska planina, Malá a Veľká Fatra, Chočské vrchy, Nízke, Západné a Belianske Tatry a Západné Beskydy.

Carpaticum. **13.** Čičmany, Klimková (Scheffer). — Strážov (Pouzar 1961 PR). — Malenica (F. A. Novák Ochr. Přír. 2: 363, 1954). **14e.** Zvolen, Pustý hrad (Freyn 1872: 346). **16.** Klak, pri kóte 1155 m (Hendrych Preslia, Praha 27: 68, 1955). — Veľká Stožka, pri kóte 1391 m (Hendrych Acta Univ. Carol.-Biol. 1968: 176, 1969). **21a.** Reváň (Scheffer 1927: 281; Nábělek et Brižický 1940 SLO). **21b.** Malý Kriváň (Szontagh 1863: 1089; Domin 1937q: 117, 118). — Stoh (Sillinger 1922 PR). — Kraľovany (Szontagh l. c., p. 1080). **21c.** Drienok (Margittai 1913 PR). — Čierny kameň (Kitaibel sec. Kanitz 1863: 465). — Gaderská dolina (Trapl 1953 SAV; Hlavaček 1973 SAV). — Klak, vrchol (Wahlenberg 1814: 81, 82; J. Wagner 1891 BP; Hulják 1917 BP). — Lubochnianska dolina (J. Wagner 1901a: 29; Schidlay 1956 SAV). — Chlatkovo, vrcholový hrebeň (Fritze et Ilse 1870: 521). — Salatínska dolina (Rochel et Kitaibel sec. Kanitz 1863: 465). — Lubochňa (V. Vraný 1900 BRA). **21d.** Choč (Krzisch 1860: 157). — Huty, horáreň Biela skala — Sivý vrch (Futák 1966). **22.** Donovaly, Predný Zvolen (Májovský 1951 SLO). — Korytnica, kúpele (Sillinger). — Ráztocký potok (Sillinger). — Salatín (Trapl 1924 PRC; Sillinger 1930 PRC). **23a.** Račkova dolina (Kotula 1889—1890: 76). — Podbanské (Mihalik 1886a: 30). — Tichá dolina (Mihalik l. c.). **28.** Oravský Podzámok (Futák 1953 SAV). — Medzihradie. — Dlhá — Krivá (Szontagh 1863: 1080).

Pochybná lokalita. **23b.** Dolina Skalnatého potoka (Hazslinszky sec. Scherfel 1880: 365).

Laserpitium prutenicum L.

Lazerník pruský

Laserpitium prutenicum L. Sp. Pl. ed. 1, p. 248, 1753.

Dvojročná až trváca, 30—100 cm vysoká, holá alebo štetinato chlpatá bylina. Koreňová hlava bez štiece. Dolné listy v obryse trojuholníkovité, dvojite až trojite perovito strihané, segmentíky sediace alebo krátko stopkaté, kopijovité, 1—2,5 cm dlhé, 0,2—0,9 mm široké, zázovové, úkrojky celistvookrajové, na líci holé, na rube ± srstnaté. Horné stonkové listy na úzkej štetinato chlpaté, na okraji kožovitej