

pritlačene štetinaté. Zložený okolík s 2 až viacerými okolíčkami, zdanlivo listom protistojný, niekedy pazušný alebo vrcholový. Stopky okolíčkov drsné. Obal chýba alebo z 1—12 listeňov, listence obalčekov početné, šidlovité. Kališné zuby kopijovité. Kvety slabo lúčovité, lupienky hlboko dvojlaločné, biele alebo ružové. Plody vajcovité až podlhovasto vajcovité, z bokov stlačené, plôdiky na chrbte na 3 primárnych rebrách krátko štetinaté, na 4 sekundárnych v 3 radoch na každom rebre ostnaté.

#### Kľúč na určenie druhov

- 1a Obal zo 4—12 listeňov, ostne plôdikov oblúkovite ohnuté, bez kotvičiek . . . 2  
 1b Obal chýba alebo z 1—2 listeňov, ostne plôdikov  $\pm$  rovné, kotvičkaté . . . . .  
 . . . . . *T. arvensis*  
 2a Obvodové lupienky len o málo dlhšie ako vnútorné, zrelé plody 2—3 mm dlhé,  
 čnelky 2—3-krát dlhšie ako stylopódium . . . . . *T. japonica*  
 2b Obvodové lupienky zreteľne dlhšie ako vnútorné, zrelé plody ca 2 mm dlhé,  
 čnelky 5—6-krát dlhšie ako stylopódium . . . . . *T. ucrainica*

#### *Torilis arvensis* (Hudson) Link

##### Torica roľná

*Torilis arvensis* (Hudson) Link Enum. Hort. Berol. Alt. ed. 1, p. 265, 1821.

Bazionym: *Caucalis arvensis* Hudson Fl. Angl. ed. 1, p. 98, 1762.

Syn.: *Torilis divaricata* Moench — *T. arvensis* (Hudson) Link subsp. *divaricata* (Moench) Thell.  
 — *T. helvetica* (Jacq.) C. C. Gmelin

##### U nás len

subsp. *arvensis*

##### Torica roľná pravá

Jednoročná, 30—100 cm vysoká bylina. Stonka zväčša od bázy rozkonárená, jemne ryhovaná, často červenkastá. Listy v obryse trojuholníkovite vajcovité alebo trojuholníkovite podlhovasté, dolné dvojite až trojite perovito strihané, horné spravidla len jednoducho perovito strihané. Segmentky, najmä vrcholové, často dlho končisté, na okraji ostro pílkovité, sivozelené. Zložený okolík so 4—12 okolíčkami. Listene obalu chýbajú alebo len z 1—2 listeňov, listence obalčekov početné, čiarovite šidlovité. Obvodové kvety nezreteľne lúčovité, lupienky asi 1,5 mm dlhé, biele. Čnelka 2—3-krát dlhšia ako stylopódium. Plody (Ic.: Tab. 18, fig. 16, p. 174) 3—6 mm dlhé, ostnaté, ostne  $\pm$  rovné, také dlhé ako šírka plodov, kotvičkaté.