

jemné, holé. Kvety vo voľnej, širokej, chabej metline. Kvetné stopky dlhšie ako kvety, veľmi tenké, pred rozkvitnutím sklonené. Koruna 4—5 mm v priemere, biela, cípy končíste. Plod hnedočierny, neoinovatený.

Chromozómy: $2n = 22$, okr. 9, Prašník (Murín et Záborský in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen-Bot. 25: 7, 1976); okr. 10, Cajlanská homola (Murín et Zahradníková l. c.).

Biológia, ekológia, fytoecenológia. Geofyt. Kvitnutie jún—august. Rastie na mierne vlhkých, humózných, ílovitých, sprašových alebo aj kamenistých pôdach. Polotienistý a mierne teplomilný druh, vyskytuje sa najmä v lesoch a na ich okrajoch v kolínnom a submontánnom stupni, ojedinele v planárnom stupni, v spoločenstvách zväzov *Carpinion* (význačný druh), v nižších polohách aj v podzväze *Eu-Fagenion*, niekedy aj vo zväzoch *Quercion pubescenti-petraeae*, *Prunion spinosae* a i.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 7. Územím Slovenska prechádza časť východnej hranice areálu. V karpatskej oblasti rastie v Malých Karpatoch, Bielych Karpatoch a Považskom Inovci. V panónskej oblasti hojnejšie na Devínskej Kobyle, vzácne na Záhorskej nížine a Podunajskej nížine.

Pannonicum. 4. Šajdíkove Humence, Hrušov (Scheffer 1923 SLO; Degen, Gáyer et Scheffer 1923: 109). — Unín (Krzisch 1857: 61; Jasičová et Zahradníková 1966 SAV). — Radošovce — Adamov. — Les Kojatín (všetko Krzisch l. c.). 5. Mnoho lokalít. 6. Bernolákovo (Zácha sec. Baudyš Biol. Pr. SAV 2/4: 35, 1956).

Carpaticum. 9. Zlatnícka dolina pri Skalici (Sillinger 1926 PR). — Javorina (Jasičová, Maglocký et Zahradníková 1966 SAV). 10. Veľmi mnoho lokalít. 11. Laz Biela Bukovina (Scheffer 1924 SLO). — Kálnica (Michalko 1963 SAV). — Selec, Hradisko (Michalko 1963 SAV).

Mylné údaje. Údaje uvedené v rôznych literárnych prameňoch z ostatných okresov možno považovať za mylné, pretože mnohé z nich boli overené a vždy išlo o zámenu s *G. schultesii*, ako napr. v okr. 1, 13, ďalej z obvodu vysokých Karpát v okr. 22, 23.

Galium austriacum Jacq.

Lipkavec rakúsky

Ic.: Tab. 6, fig. 2, p. 34

Galium austriacum Jacq. Fl. Austr. 1: 51, 1773.

Syn.: *Galium asperum* Schreber var. *austriacum* G. Beck — *G. pumilum* Murray subsp. *austriacum* Jáv. — *G. pumilum* Murray subsp. *asperum* (Schreber) Dostál

Trváca, (5—) 10—25 (—35) cm vysoká, trsovitá bylina. Podzemok tenký, kužeľovitý. Stonka štvorhranná, poliehavá alebo vzpriamená, rozkonárená, holá alebo chlpatá, na báze červená. Internódiá v dolnej časti stonky veľmi krátke, v strednej 1,5—2,5-krát dlhšie ako listy. Listy v 5—8 (—9)-početných praslenoch, slabo ko-