

Burde, v Ipeľsko-rimavskej brázde a vo východnej časti Podunajskej nížiny. V ostatných okresoch je zriedkavejší až vzácny. Z Košickej kotliny doteraz nie sú údaje. V karpatskej oblasti rastie iba v okresoch predkarpatskej flóry, hojne v Slovenskom stredohorí, najmä v Štiavnických vrchoch, v Malých Karpatoch a Trábeči.

Pannonicum. 1, 2. Hojne. 3. Plešivec, plošina Koniar, medzi vrchmi Hrad (Vártető) a Zásuky (Gyapjú tető) (Holub, Preslia, Praha 29: 210, 1957). 4. Stupava (Futák 1948). — Plavecký Štvrtok (Domin 1929; Sillinger 1929 PR). — Jakubov. — Malacky NE, Bor. — Veľké Leváre (všetky lokality Degen, Gayer et Scheffer 1923: 109). 5. Viac lokalít. 6. V južných častiach okresu hojne, na okrajoch roztrúsene a v strede chýba. 8. V južnej časti mnoho údajov z lokalít Viničky. — Malá Bara. — Ladmovce. — Kráľovský Chlmec. — Hraň S, kopec Stuchlá (Avaš) (Berta 1953). — Trebišov SW, les Čongov (Berta 1956). — Vinné (Margittai 1927a: 163).

Carpaticum. 11. Jalšové. — Jalšové — kopec Jachnová. — Sokolovce N. — Vrch Havran. 12. Viac údajov. 13. Dolné Vestenice NW (Futák 1947a: 190). — Rokoš (Futák Biológia, Bratislava 16: 420). 14. Hojne. 15. Zelené, N od obce (Magie Biológia, Bratislava 17: 563, 1962). — Mýtina. — Dobročská Lehota (obe Magic). — Hnúšťa SW od obce ku kóte 755 (Hendrych Preslia, Praha 30: 195, 1959). — Rybník SW, vrch Hrad (Hendrych Biol. Pr. SAV 9/6: 26, 1963). — Rudník NE, vrch Podkovce (Michalko 1963 SAV). 16. Tisovec, Suché doly (T. Blattny 1954. BRA).

Zaniknuté lokality. 10. Bratislava, v okolí viac lokalít zaniklo výstavbou nových sídlisk.

Mylný údaj. 22. Liptovský Hrádok. — Liptovský Ján (Kanitz 1862—1863, 13: 66 a 99 1863).

LITERATÚRA

- Hendrych, R.: Bemerkungen zur Variabilität von *Cruciata glabra* (*Galium vernum*). Preslia, Praha 49: 193—201, 1977.
- Záborský, J., Zahradníková, K.: Poznámky k variabilite a k rozšíreniu krížavky jarnej *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. Biológia, Bratislava 31: 55—61, 1976.

Rubia L.

Marena

Rubia tinctorum L.

Marena farbiarska

Rubia tinctorum L. Sp. Pl. ed. 1, p. 109, 1753.

Trvác, 50—100 cm vysoká bylina, s plazivým, červeným, farbiacim podzemkom. Stonka vystúpavá alebo priama, štvorhranná až krídlatá, na hranách naspät drapľavo háčikatá alebo holá. Listy krátko stopkaté, v štvorpočetných až šesťpočetných praslenoch, tuhé, vajcovité, vajcovite kopijovité až kopijovité, na vrchole hrotité,