

doposiaľ urobilo veľa pokusov o ich usporiadanie. Napr. vyzdvihnutie znakov – ochlpenie listov alebo postavenie kališných lístkov. Tvary s listami holými a kališnými lístkami celkom vztýčenými patrili k *R. vogesiaca*, tvary s listami holými, s kališnými lístkami nepravidelne rozloženými (nikdy nie ohnutými) sa zaraďovali k *R. subcanina* (takýchto ruží je u nás najviac). V odenom „chlpatom“ rade to boli *R. coriifolia* a *R. subcollina*. Ak sa pridruží ďalší znak, napr. prítomnosť žliazok na listoch alebo na kvetných stopkách, mohli by sa preložiť ďalšie roviny paralelnej premenlivosti (sieťovej variability). Mnohé nomenklatorické kombinácie na rozličnej taxonomickej rovine (najčastejšie druhovej alebo poddruhovej) neboli nikdy výrazne podložené geografickým rozšírením. Z tohto hľadiska išlo najčastejšie iba o formy.

Biológia, ekológia. Fanerofyt. Kvitnutie jún. V kultúre potvrdený vek indivídua nad 40 rokov. Pôvodná rastie v svetlých lesoch, lesných pláštoch a na presvetlených miestach, druhotne na otvorených priestranstvách, medziach, pastvinách, úvozcach ciest, najmä na miestach ustupujúcich agrikultúr (pasienky, opustené vinice, bývalé polia), na celom území od planárneho do montánneho stupňa. Maximum nad 1200 m n. m.

Rozšírenie na Slovensku. V panónskej oblasti dnes dosť obmedzené agrikultúrou, najmä v nížinách, napriek tomu časté v karpatskej oblasti.

Rosa villosa L.

Ruža jabĺčková

Ic.: Tab. 5, fig. 4, p. 60

Rosa villosa L. Sp. Pl. ed. 1, p. 491, 1753.

Syn.: *Rosa mollis* Sm. – *R. pomifera* J. Herrmann

Prútnatý, rozkonárený nízky, 150 výnimočne až 200 cm vysoký ker s oblúkovitými konármi (fakultatívne aj polykormóny). Konáre ostnaté; ostne veľmi štíhle, priame, rovné, výnimočne mierne šikmo hore alebo nadol ohnuté, na báze terčovité, na starších výhonkoch nepravidelne rozmiestnené, na kvetonosných konárnikoch a predlžovacích konárnikoch infrastipulárne, nikdy nie párové. Prílisky mnohotvaré, široké, takmer po celej dĺžke prirastené k husto a krátkochlpatej listovej stopke. Listy striedavé, nepárno perovite zložené 5–7-jarmové, opadáajúce; lístky sivo-modrozelené, pomerne veľké (30–40 mm aj väčšie), elipsovité, podlhovasto vajcovité, vzácné okrúhle, končisté, niektoré tupokončisté, na báze klinovité, nápadne po oboch stranách striebrišto chlpaté, na rube až plstnaté, ± husto, na líci riedko žliazkaté alebo bez žliazok, na okraji hrubo dvojite pílkovité, na vrchole žliazkaté; žliazky voňajúce terpentínom. Kvety v málokvetých súkvetiach, prípadne jednotlivito. Kališné lístky takmer všetky bez prívěskov alebo len na vonkajších