

Lenartov (Pospíšil 1961 BRNM). 30c. Skrabske (Kláštorský et Měsíček 1961 PR). – Lackovce. – Drienové (Větvička 1970 PR).

Všeobecný údaj. 21c. Martin „svahy Velkej Fatry“ (Margittai 1915 PRC).

Rosa canina L.

Ruža šíповá

Ic.: Tab. 6, fig. 2, p. 63

Rosa canina L. Sp. Pl. ed. 1, p. 491, 1753.

Syn.: *Rosa canina* L. subsp. *vulgaris* Gams – *R. corymbifera* Borkh. – *R. dumetorum* Thuill. – *R. nitidula* auct. non Besser – *R. lutetiana* Léman – *R. andegavensis* Bast. – *R. squarrosa* (Rau) Boreau – *R. blondeana* Ripart ex Déséglise – *R. caryophyllacea* Besser p. p. – *R. platyphylla* Rau – *R. déséglisei* Boreau – *R. communis* Rouy.

Opieravá, 10 m vysoká (aj vyššia) liana s mnohoročnými kmienkami alebo viackmenný 100–300 cm vysoký ker so vzpriamenými, častejšie oblúkovite ohnutými, krátkovekými konáríkmi. Konáriky ostnaté, zriedka bez ostňov (*Rosa canina* cv. *inermis*). Ostne rovnakého tvaru (homoakantné), ohnuté, zväčša háčikovité, so zúženou bázou, nepravidelne rozptýlené; kvetnosné konáriky niekedy aj bez ostňov, staršie konáre a mladé konáriky obzvlášť vždy ostnaté. Prílistky aspoň do polovice prirastené k listovej stopke, na okraji vždy žliazkaté. Listy opadáajúce, striedavé, nepárno perovite zložené, 5–7-jarmové. Listky jemné, elipsovité, široko elipsovité, vajcovité, končisté, na báze klinovité alebo zaokrúhlené s krátkymi stopôčkami, voskovo oinovatené, lesklé, svetlo žltozelené aj tmavozelené, chlpaté alebo holé alebo na rube na strednej žile chlpaté, vzácnejšie žliazkaté, na okraji dvojito alebo zriedkavejšie jednoducho pílkovité, žliazkaté. (Vplyvom vonkajších podmienok bývajú čepielky zložené pozdĺž strednej žilky do písmena V.) Kvety jednotlivé alebo v ± málopočetných súkvetiach, svetloružové, zriedka biele. Kališné lístky (prvé 3 – perovite strihané, prostredný iba do polovice), holé alebo riedko chlpaté a žliazkaté, aj po odkvitnutí naspät ohnuté (výnimočne 2 posledné rovnovážne rozložené), skoro pred dozretím šípok opadáajúce. Korunné lupienky široké, navzájom sa dotýkajúce, slabo voňajúce. Tyčínik mnoho, peľnice žlté. Čneliek mnoho (menej ako pri *R. dumalis*), v šípkach chlpaté, nad ústím riedko chlpaté alebo holé. Disk široký, zväčša kuželovito vykľenutý. Ústie veľké. Stopky plodov dlhšie aj kratšie ako šípky, holé, chlpaté, veľmi zriedkavo roztrúsené stopkatožliazkaté; žliazky ± bez vône. Šípky variabilné, elipsoidné, vajcovité, hrúskovité, guľovité, stlačene guľovité, holé alebo (veľmi vzácne) roztrúsené žliazkaté, na báze stopkatožliazkaté, oranžovočervené až hnedočervené, zrelé mäkké. Nažiek mnoho, belavé.

Chromozómy: $2n = 35$, meióza nepravidelná, okres. 3. Plešivec (Kláštorský et Kláštorská); okr. 13. Nitrianske Rudno (Kláštorský in Končalová et