

2b Hypantiá najčastejšie 3–5,5(–8) mm dlhé, 4-krídlové; krídla 0,5–1,0 mm široké, belavé až hnedasté, ploché alebo zvlnené, na okraji spravidla nepravidelne zúbkaté, plochy medzi krídlami s hlbokými jamkami alebo krátkymi hlbokými brázdami, vypukliny, resp. listy medzi nimi väčšinou nepravidelne zúbkaté alebo ostnaté *S. muricata*

Poznámka. Na správne určenie *S. minor* a *S. muricata* sú potrebné dobre vyvinuté hypantiá oddelené od listeňov, listencov a zvyškov kalicha, ale s neporušenými rebrami, resp. krídlami, ktoré sú krehké a ľahko sa odlamujú. Zvyšky kalicha sa niekedy nesprávne považujú za krídla hypantia. Kvitnúce jedince nemožno podľa veľkosti kalichov, súkvetí, listov, odenia a pod. spoľahlivo určiť.

Sanguisorba officinalis L.

Krvavec lekársky

Ic.: Tab. 10, fig. 1, p. 103

Sanguisorba officinalis L. Sp. Pl. ed. 1, p. 116, 1753

Syn.: *Poterium sanguisorba* A. Gray

Trváca, spravidla holá bylina s 5–30 mm hrubým, valcovitým, 15 cm dlhým (i dlhším), vodorovným alebo šikmým, nerozkonáreným alebo rozkonáreným, svetlohnedým až čiernohnedým podzemkom s viacerými adventívnymi koreňmi, z ktorých niektoré nápadne vretenovito až repovito hrubnú. Byle (20–)40–60(–120) cm vysoké, priame, tuhé, ryhované, v hornej polovici zväčša bohato rozkonárené, riedko olistené. Listy nepárno perovité, prízemné v riedkej ružici, (8–)25–40(–60) cm dlhé (3–(4–7(–8)-jarmové, dlhostopkaté. Lístky stopôčkaté (stopôčky až 15 mm dlhé), vajcovité až široko vajcovité alebo vajcovito kopijovité až kopijovité, (10–)20–35(–50) mm dlhé, (7–)10–20(–25) mm široké, na báze zväčša srdcovité, vzácne uťaté až zaokrúhlené, na vrchole zaokrúhlené až končité, na okraji pílkovité až dvojito pílkovité, na líci tmavozelené, holé, na rube sivozelené, holé alebo s ojedinelými chlpmi na hlavnej žile. Lístkové prílistky väčšinou chýbajú a ak sú vyvinuté, sú voľné, vajcovito kopijovité, pílkovité, trváce. Stredné a horné byľové listy podobné listom prízemným, ale menšie, často len 3-jarmové, holé; voľná časť prílistkov šikmo vajcovitá, pílkovitá. Hlávky valcovité, husté, 13–30 mm dlhé a 8–15 mm v priemere, zväčša na dlhých konároch, vreteno hlávky chlpaté. Listene a listence hrdzavé, suchoblanité, na okraji a v dolnej časti na rube chlpaté, listene kopijovité, 3–3,5 mm dlhé, dlhšie ako púčiky. Listence vajcovité, 1,5–2 mm dlhé. Kvety malé, obojpohlavné. Hypantium v čase kvitnutia krčiazkovité, kališné zuby široko kopijovité až vajcovité, čiernopurpurové až krvavočervené, v dolnej polovici