

(Wahlenberg 1814: 148; Kárpáti l. c.). – Ďumbier (Heuffel BP; Kárpáti l. c.). **23a.** Rozpadnutý grúň (J. Šmarda et al. Kvet. Toman. Dol., p. 34, 1966). **23b.** Temnosmrečianska dolina (Jos. Dostál 1950a: 708; Hadač 1948b: 247). – Červené pleso (Somora Sbor. pr. o Tatran. Nár. Parku, p. 324, 1961). – Zelené pleso (Kežmarské) (Townson 1797: 489 sec. Wahlenberg l. c.).

Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti

Jarabina Margittaiho

Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti Feddes Repert. 62: 304, 1960.

Bazionym: *Sorbus hostii* (Jacq. fil.) K. Koch subsp. *margittaiana* Jáv. Schaedae Fl. Exs. Hung. Cent. 8. No. 750, 1915

Ker. Čepeľ listov elipsovité, báza zaokrúhlená alebo klinovitá, vrchol krátky, tupý, okraj veľmi plytko až nezreteľne laločnatý, drobne pílkovitý. Na líci holá, lesklá, na rube menej husto plstnatá.

Tradovaná ako viac-menej ustálený, hybridogénny druh (pravdepodobne *S. chamaespilus* x *S. austriaca*), s istotou doteraz známy len z Krivánskej Fatry z podvrcholových spoločenstiev Suchého vrchu (ca 1460 m, typus). Objavená a publikovaná Jávorkom 1915. Zbery z tejto lokality sa nachádzajú vo viacerých zahraničných herbároch v dvoch rozdielnych centúriách (Margittai Fl. Hung. Exsicc. Cent. VIII. no 750, 1927; Krist Fl. Exs. Republ. Bohemoslov. no 911, sec. Kárpáti p. 306, 1960).

Ako primárne hybridy zo Slovenska sa udávajú

Sorbus ambigua (Decne) Nyman

Jarabina obojaká

Sorbus ambigua (Decne) Nyman, Consp. p. 242, 1878.

Bazionym: *Aria ambigua* Decne Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 10: 165, 1874

Čepeľ listov podlhovasto obrátene kopijovitá, okraj pílkovitý, na rube plstnatá.

Udávaná ako primárny hybrid (*S. aria* x *S. chamaespilus*) z Veľkej Fatry, z vrcholu Čierneho kameňa (publikoval Jávorka 1915 podľa Borbásových, Lengyelových a Huljáčkových zberov sec. Kárpáti p. 306, 1960; Kovanda 1978), z Chočských vrchov, medzi Sivým vrchom a Ostrou, ca 1670 m n. m. v kosodrevine (Pawłowski Fl. Tatr. 1., p. 515, 1956).