

a Podunajskej nížine („Szilaska hegy“ pri Leviciach, Krist 1935 PR). V karpatskej oblasti len ojedinele v južnej časti Malých Karpát. Slovenskom prebieha severná hranica celkového rozšírenia.

*Vicia cassubica* L.

Vika kašubská

*Vicia cassubica* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 735, 1753.

Syn.: *Vicia multiflora* Pollich.

Trváca, 30—80 (—100) cm vysoká bylina. Koreň hrubý, plazivý. Byl priama alebo vystúpavá, rozkonárená, hrubá, hranatá, hnedozelená, odstávajúco chlpatá. Prílistky pološípovité až kopijovité, (5—) 8—13 mm dlhé, tmavozelené, chlpaté. Listy 8—12 (—16)-jarmové, zakončené krátkou rozkonárenou úponkou, dolné jarmo lístkov na báze kostrnky. Lístky krátkostopôčkaté; stopôčky lístkov  $\pm$  1 mm dlhé; čepielky lístkov elipsovité, podlhovasté až vajcovité, na vrchole zaokrúhlené, špičkaté, na báze náhle zúžené alebo zaokrúhlené, 8—28 (—35)  $\times$  3—8 (—10) mm veľké, zelené až olivovozelené, na líci slabo lesklé, roztrúsene chlpaté až holé, na rube lesklé, odstávajúco chlpaté. Súkvetie krátky stravec, s (5—) 10—15 kvetmi, kratší ako podporný list. Stopky súkvetia (3—) 4—10 (—13) cm dlhé, chlpaté. Kvetné stopky 4—5 mm dlhé. Kvety šikmo odstávajúce až ovisnuté. Kalich široko zvonkovitý, 4,5—5,5 mm dlhý, hrdzavohnedý, roztrúsene chlpatý až chlpatý; kališné zuby nerovnako dlhé, horné trojuholníkovité, dolné šidlovité, kratšie ako kališná rúrka. Koruna 10—12 mm dlhá; strieška obrátene vajcovitá, červenofialová, lupeň  $\pm$  taký dlhý ako nechťík; krídla končisté, laločnaté,  $\pm$  také dlhé ako článok, o málo kratšie ako strieška, ružovofialové, zriedka biele, článok rovnakej farby ako krídla. Struky širokoelipsoidné, (10—) 13—18 (—21)  $\times$  (4,5—) 5—7 (—8) mm veľké, svetlo hrdzavohnedé až červenofialové, holé, s 1—2 (—3) semenami; karpofor  $\pm$  2 mm dlhý. Semená sféroidné, štvorcovité, obrátene vajcovité až guľovité, (3—) 3,5—5 mm 3—3,5  $\times$  3—3,2 mm veľké, pieskovohnedé, tmavo hrdzavohnedé až olivovozelené, červenočierne škvrnité, vzácné jednofarebné, zamato-vomatné, hladké; hilum zaberá 1/3—1/4 obvodu semena.

Chromozómy:  $2n = 12$ , okr. 8, Kysta, okr. 10, Bratislava-Karlova Ves (Činčura Biológia, Bratislava 17: 300, 1962).

Variabilita. Premennivosť sa význačnejšie prejavuje len v odení (for. *glabrata* Schlecht. je až holá, for. *villosa* Schlecht. husto chlpatá), v šírke lístkov a v počte kvetov v súkvetí (var. *pauciflora* Domin má iba 2—4 kve-