

Pannonicum. 2. Malá Čalomija (Svobodová et Řehořek Acta Agrotechn., Nitra 10: 188, 19). — Chrámeč SE (Holub et Moravec Biol. Pr. SAV 11/6: 1957). 4. Moravský Ján (Žertová 1960 PR). — Skalica, „Čierne jazero“ a „Rybník“ (J. Knapp 1865b: 172). 6. Šamorín (Láska 1930 PRC). — Sládkovičovo, „Razika“ (Potúček Zborn. Slov. Nár. Múz.-Prir. Vedy 12/1: 114, 1966). — Hájske (Krist 1940a: 47). — Sládečkovce (Weber 1933 PR). — Dolný Jatov — Tvrdošovce (Jos. Dostál 1955 PRC). — Palárikovo E, pri mlyne Malé Čiky (Weber 1933 PR). — Zlatná na Ostrove (Weber 1933 PR). — Komárno (Lhotská 1969 PR). — Komárno, Lándor (Hejný Ōkol. Charakt., p. 368, 1960). — Gbelce, okolie (Svobodová; Chrtková 1963). — Čenkov (Neilreich 1866: 333). — Kamenín, okolie (Weber 1932; Žertová 1958, 1963).

Melilotus altissima Thuill.

Komonica najvyššia

lc.: Tab. 12, fig. 3, p. 243

Melilotus altissima Thuill. Fl. Paris. ed. 2: 378, 1799.

Syn.: *Trifolium melilotus* γ *officinalis* L. Sp. Pl. ed. 2, p. 1078, 1762 — *M. perfrondosus* Borbás ex O. E. Schulz

Dvojiročná alebo krátkodobo trvávajúca, 50—150 (—200) cm vysoká bylina. Koreň až 60 cm dlhý a až 5 cm hrubý. Byľ priama, rozkonárená, tupo hranatá, ryhovaná, holá, často fialovastá alebo červenkastá. Prilistky šidlovité, celistvookrajové alebo prilistky dolných listov niekedy na báze s 1—2 zubmi, 5—12 mm dlhé, zelené, \pm holé. Listy stopkaté, stopky listov 0,5—1 cm dlhé. Lístky stopôčkaté; stopôčka vrcholového lístka 2—4 mm, bočných lístkov \pm 0,5 mm dlhé; čepeľky čiarkovité, úzko podlhovasto čiarkovité až obrátene kopijovité, na vrchole uťaté alebo zaokrúhlené, na báze zúžené, (12—) 20—40 \times (2—) 4—10 mm veľké, pilkovité, pilkovite zúbkaté, plytko zúbkaté až celistvookrajové, sýto až tmavozelené, vzácnejšie sivasté, holé; žily vyčnievajúce, v 8—14 pároch. Súkvetie voľný, predĺžený stavec, 20—80 mm dlhý, 2—3-krát dlhší ako podporný list, po odkvitnutí sa predlžuje, so (7—) 20—60 kvetmi. Stopky súkvetia 20—80 mm dlhé. Kvetné stopky 1—2 mm dlhé. Kvety ovisnuté. Kalich zvonkovitý, \pm 2 mm dlhý, zelený, holý; kališné zuby trojuholníkovité, horné na vrchole šidlovité, \pm také dlhé ako kališná rúrka. Koruna 5—6 (—7) mm dlhá, žltá, striedka často hnedo prúžkovaná, slabo voňavá, obrátene vajcovitá; krídla a člnok \pm rovnako dlhé, o málo kratšie ako striedka. Struky široko elipsoidné, (3—) 4—4,8 (—6) \times (2,1—) 2,2—2,7 (—2,9) mm veľké, tmavo hnedosivé až tmavosivé, chlpaté až roztrúsene chlpaté, s 1—2 semenami; karpofor \pm 0,6 mm dlhý. Semená asymetricky srdcovité až úzko srdcovité, 2—