

Fytogeografická poznámka. Hoci Dostál (1931: 154, 1950: 752) považuje výskyt tohto druhu u nás za pochybný a pripúšťa, že mohol byť introdukovaný alebo adventívny, ale na nevhodnom stanovišti vyhynul, Hendrych (1963: 234) na základe rozboru areálu a na základe porovnania areálu s niektorými paleogeografickými závermi tvrdí, že *T. lupinaster* L. predstavuje v Európe migranta z posledného glaciálu. Rozšírenie tohto druhu bolo najväčšie v období raného postglaciálu. Z tohto obdobia pochádza podľa Hendrycha i jeho výskyt v Karpatoch.

Trifolium laevigatum Poiret

Ďatelina tuhá

Trifolium laevigatum Poiret Voy. Barb. 2: 219, 1789.

Syn.: *Trifolium strictum* L. — *Paramesus strictus* (L.) C. B. Presl.

Rastlina jednoročná. Stonka priama alebo vystúpavá, 5—20 (—30) cm vysoká, málo rozkonárená, holá. Dolné listy dlhostopkaté. Lístky čiarkovite kopijovité, 2—4 cm dlhé, na okraji žliazkato zúbkaté a ostinkaté, na vrchole končisté, na spodnej strane s vyniknutou žilnatinou. Prilistky vajcovité, pošvovite zrastené, žliazkato zúbkaté. Kvetné hlávky dlhostopkaté, priame, pazušné, 7—10 mm v priemere, guľovité, listene golierovite zrastené, dlhšie ako kvetné stopky. Kališná rúrka vrtidlovitá, holá, kališné zuby šidlovité, rozprestreté, dlhšie ako kališná rúrka. Koruna 5—6 mm dlhá, ružová; strieška o niečo dlhšia ako kalich. Struky okrúhle, na chrbtovej strane zdurené, dvojsemenné.

Chromozómy: $2n =$

Biológia, ekológia, fytocenológia. Terofyt. Kvitnutie máj, jún. Rastie na strniskách v planárnom stupni v spoločenstvách zväzu *Festucion pseudovinae*.

Rozšírenie na Slovensku. Druh zriedkavý, rastie iba v okrese Podunajská nížina v okolí Štúrova pri obci Kamenný Most (Krist 1937g: 6, 7).

Trifolium montanum L.

Ďatelina horská

Ic.: Tab. 13, fig. 3, p. 285

Trifolium montanum L. Sp. Pl. ed. 1, p. 770, 1753.

Syn.: *Amoria montana* (L.) Soják