

Pannonicum. 2. Hámor, pri obci (Svobodová et Řehořek Acta Agrotechn., Nitra 10: 189, 1964). 4. Zohor — Lozorno (Gáyer 1917a: 76). — Plavecký Štvrtok — Malacky (Degen, Gáyer et Scheffer 1923a: 90). 6. Malá Mača (Potůček Sborn. Slov. Nár. Múz.-Prír. Vedy 12/1: 116, 1966). — Šoporňa (A. Hollá-Niková 1974). — Kamenný Most (Manica 1962). 7. Obec Chorváty, pri rieke Bodva. — Obec Peder. — Mokrance S. — Čečejevce S. — Obec Perín, N (Hendrych Preslia, Praha 38: 142, 1966).

Carpathicum. 14b. Vrch Žarnov (Pišút Biológia, Bratislava 32: 78, 1977). 20. Jasenov, v obci a okolí. — Podskalka, okolo riečky Ptava (L. Dostál Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 63, 1977). — Chlmec, pri potoku Ptava (Hudáková-Töröková 1976). — Podhorod, v obci (L. Dostál Biológia, Bratislava 35: 307, 1980). 30c. Veľa lokalít. 31. Snina, vľavo od cesty k Stakčinu pod južným okrajom lesa Magurica (L. Dostál Biológia, Bratislava 35: 307, 1980). — Ruská Volová (Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 18: 59, 1970; L. Dostál Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 63, 1977).

Trifolium aureum Pollich

Ďatelina zlatožltá

Ic. Tab. 13, fig. 2, p. 285

Trifolium aureum Pollich Hist. Pl. Palat. 2: 344, 1777.

Syn.: *Trifolium agrarium* L. nom. ambig. — *T. strepens* Crantz nom. illeg. — *T. campestre* C. C. Gmelin non Schreber — *Chrysaspis aurea* (Pollich) E. L. Greene

Rastlina dvojročná, zriedka jednoročná. Byl pomerne hrubá, vzpriamená alebo vystúpavá, obyčajne 15—30 (—40) cm vysoká, rozkonárená, vzáčne jednoduchá, bohato olistená, pritlačene chlpatá alebo lysavejúca. Listy krátkostopkaté, stopky obyčajne nie dlhšie ako 10 mm; lístky ± sediace, čepielka lístkov podlhovasto obrátene vajcovitá, až slabo rombická, 15—20 mm dlhá, najširšia v strede, v horných 2/3 na okraji zúbkatá, na vrchole uťatá alebo slabo vykrojená, tmavozelená, na spodnej strane modrastozelená. Prílistky podlhovasto kopijovité alebo kopijovite vajcovité, na báze nerozšírené, bez ušíek, také dlhé alebo dlhšie ako listová stopka. Kvety v hlávkach na bočných konároch. Stopka hlávky hrubá, tuho priama, rovnako dlhá alebo dlhšia ako podporný list, za plodu až 50 mm dlhá. Hlávka hustá, 35—50 (—60)-kvetá, guľovitá, neskôr, najmä za plodu vajcovitá, ± 10—16 mm dlhá a 7—10 mm široká. Kvety krátkostopkaté, po odkvitnutí ovisnuté, 6—7 mm dlhé. Kalich rúrkovitý, 5-žilový, holý; dolné kališné zuby oveľa dlhšie ako horné a ako kališná rúrka. Koruna (4—) 5—6 (—7) mm dlhá, zlatožltá, po odkvitnutí žltohnedá, hnedastá, suchoblanitá. Strieška vajcovitá, lyžicovitá, na okraji podvinutá, oveľa dlhšia ako krídla a člnok, na okraji v dolnej časti zúbkatá, na vrchole vykrojená. Krídla s dlhým nechúikom. Čnelka taká dlhá alebo dlhšia ako plod. Struk jednosemenný; semená guľovitá.