

Chromozómy: $2n = 14$, okr. 8, Malčice, Biednica (Váchová et Májovský in Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 22: 19, 1974).

Variabilita. Druh veľmi málo premenlivý.

Biológia, ekológia, fytocenológia. Hemikryptofyt. Kvitnutie jún—august. Rastie na okrajoch lesov, lesných lúkach, v svetlých lesoch, na pasienkoch, suchších lúkach, vo vinohradoch, na rúbaniskách, v kriachinách, na trávnatých svahoch na plytkej, na živiny chudobnejšej pôde, na nevápennom podklade od kolínneho až do montánneho stupňa v spoločenstvách zväzov *Quercion pubescenti-petraeae*, *Geranion sanguinei*, *Xerobromion*, *Festucion valesiaceae* a iných. Maximum: 1412 m n. m., okr. 22, Kráľova hoľa (Domin 1921 PR).

Rozšírenie na Slovensku. Druh rozšírený zriedkavejšie v okresoch panónskej oblasti. Nie je známy z Košickej kotliny. Vyskytuje sa takmer vo všetkých okresoch karpatskej oblasti zriedkavo až hojnejšie. Doteraz nemáme údaje z okresov Južné Biele Karpaty, Slovenský raj, Stredné Pohornádie, Liptovská kotlina, Čergov a Bukovské vrchy.

Trifolium campestre Schreber in Sturm

Ďatelina poľná

Ic.: Tab. 14, fig. 1, p. 287

Trifolium campestre Schreber in Sturm Deutschl. Fl. Abt. 1, Band 4, Heft 16 (sine pag.), 1804.

Syn.: *Trifolium agrarium* L. p. p. — *T. procumbens* L. nom. ambig. — *T. aureum* auct. non Pollich — *Chrysaspis campestris* (Schreber in Sturm) Desv.

Rastlina jednoročná, niekedy dvojročná. Byl' poliehavá, vystúpavá, vzáčne vzpriamená, chabá, 7—40 (—60) cm dlhá, rozkonárená, zriedka jednoduchá, holá alebo pritlačene chlpatá. Listy krátkostopkaté, stopky 3—20 mm dlhé. Lístky obrátene vajcovité, 8—10 mm dlhé, na báze klinovité, na vrchole tupé alebo plytko vykrojené, v hornej polovici na okraji zúbkaté; prostredný lístok dlhšiestopôčkatý ako bočné, jeho stopôčka 4—5 mm dlhá. Prílistky vajcovite kopijovité, na báze rozšírené a zaokrúhlené, na vrchole končisté, 4—6 mm dlhé, kratšie ako listová stopka. Stopka súkvetia hrubá, priama alebo odstavajúca, taká dlhá alebo až 2-krát dlhšia ako podporný list. Hlávka guľovitá, neskôr vajcovitá, 8—12 mm v priemere, hustá, 25—40 (—60)-kvetá. Kvety 3,5—5 mm dlhé, kratučkostopkaté, živožlté, po odkvitnutí dlhšiestopkaté, hnedožlté, sucho blanité, strechovite sa kryjúce, nazad ohnuté. Kalich 5-žilový, belavožltý, holý;