

kališné zuby nerovnako dlhé, spodné kopijovité, dlhšie, horné trojuholníkovité, kratšie ako kališná rúrka. Strieška široko lyžicovitá, značne dlhšia ako krídla a člnok, na vrchole zaokrúhlená alebo vykrojená, krídla na vrchole tupé; člnok na vrchole s nezreteľným zárezom, člnok i krídla aj po odkvitnutí k sebe sklonené. Čnelka niekoľkokrát kratšia ako vajcovitý, jednosemenný struk. Semená vajcovité, svetlohnedé.

Chromozómy:  $2n = 14$ , okr. 5, Devín, nad obcou (Váchová et Májovský in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 22: 19, 1974).

Variabilita. Druh premenlivý vo vzraste, veľkosti, v tvare lístkov atď. Infrašpecifické taxóny však väčšina autorov hodnotí najvyššie ako variety. Rastliny s byľami  $\pm$  vzpriamenými, hrubšími a so stopkami súkvetia takými dlhými alebo o málo dlhšími ako podporný list a s kvetmi 4—5 mm dlhými, živožltými sú považované za nominátnu varietu: var. *campestre* (Syn.: *T. campestre* var. *majus*; *T. procumbens* a. *majus* Koch, *T. campestre* a. *genuinum* Rouy et Fouc.). Exempláre s poliehavými alebo  $\pm$  vystúpavými byľami, so stopkami súkvetia až 2-krát dlhšími ako podporný list, s hlávkami menšími ako 1 cm v priemere a s kvetmi najviac 3 mm dlhými, svetložltými boli opísané ako *T. campestre* var. *minus* (Koch) Gremler (Syn.: *T. campestre* Schreber var. *pseudoprocumbens* (C. C. Gmelin) Lloyd). Táto varieta habitom pripomína druh *T. patens* Schreber in Sturm, a preto si ho mnohí botanici pri určovaní s ňou zamieňali a mylne určovali druh *T. patens* ako *T. campestre*.

Biológia, ekológia, fytoecológia. Terofyt. Kvitnutie jún, júl. Rastie na suchších i vlhších pasienkoch, lúkach, v priekopách, na poliach ako burina, na okrajoch lesov, popri cestách, na rúbaniskách i vo viniciach, na železničných násypoch a inde na piesočnatých i hlinitých, výhrevných, humóznych, zásaditých pôdach v spoločenstvách zväzov *Arrhenatherion elatioris*, *Xerobromion*, radu *Festucetalia valesiacea*. Považuje sa za charakteristický druh triedy *Festuco-Brometea*. Maximum: 750 m. n. m., okr. 14e. Holík (Mikyška 1933: 360).

Rozšírenie na Slovensku. Druh hojne rozšírený v planárnom až v submontánnom stupni vo všetkých okresoch panónskej oblasti okrem Burdy a Košickej kotliny. V karpatskej oblasti je známy najmä v okresoch obvodu predkarpatskej flóry. Inde sa vyskytuje zväčša až ojedinele.

### *Trifolium dubium* Sibth.

#### Ďatelina pochybná

*Trifolium dubium* Sibth. Fl. Oxon. p. 231, 1794.