

Pannonicum. 1. Hojne, mnoho lokalít. 2. Salka W (Žertová 1959 PR). — Malé Kosihy (najsevernejšia lokalita v tejto oblasti) (Žertová 1959 PR). 5. Mnoho lokalít na vhodných stanovištiach. 6. Bratislava, Vlčie hrdlo (Wiesbaur 1867 BRNU). — Šintava, les Dubník (Michalko 1957 SAV; Chrtková 1965 PR). — Nová Vieska (Futák 1953 SAV). — Gbelce, Drieňová hora (Futák 1953 SAV; Osvačilová Biológia, Bratislava 11: 419, 1956; Žertová 1961; Chrttek et Chrtková 1965 PR). — Čenkov (Hlavaček 1957 SAV; Futák 1961 SAV). — Belanské kopce (mnoho lokalít z celého územia). — Biňa (Krist 1935 BRNU; Futák 1958 SAV). — Kamenín (Futák 1958 SAV). 10. Pezinok (Holuby 1911 PRC). — Pezinok — Modra (Žertová 1961 PR). — Smolenice — Jablonica (Nevole 1927 BRNU). — Trstín — Buková (Žertová 1960 PR). — Buková E (V. Valenta 1937 BRA; Futák 1961 SAV). — Buková W, Hrubý Kamenec (Futák 1948 SLO; Jasičová 1956 SAV; Žertová 1960 PR).

Poznámka. Údaje o výskyte krížencov medzi *L. borbasii* a tetraploidným druhom *L. corniculatus* sú mylné.

Ochrana. Ohrozený druh.

Lotus corniculatus L.

Ladenec rožkatý

Ic.: Tab. 15, fig. 3, p. 348

Lotus corniculatus L. Sp. Pl. ed. 1, p. 775, 1753.

Syn.: *Lotus pentaphyllus* Gilib. — *L. corniculatus a typica* G. Beck — *L. corniculatus A eucorniculatus* Ascherson et Graebner — *L. corniculatus* subsp. *corniculatus*.

Trvára, 15—40 (—60) cm dlhá bylina. Podzemok až 100 cm dlhý. Byl polievavá, vystúpavá až priama, od bázy rozkonárená, tupo hranatá, ryhovaná, plná alebo dutá, holá, brvitá alebo chlpatá. Lístky horného jarma a vrcholový lístok so stopôčkami \pm 1 mm dlhými; čepeľky široko obrátene vajcovité, široko vajcovité, obrátene vajcovité, obrátene kopijovité až kopijovité, vzácne takmer okrúhle alebo srdcovité, na vrchole krátko končisté, (2—) 8—30 \times (1—) 4—14 mm veľké, živo až sýtozelené, hnedozelené, sivasté až sivé, bylinné, holé, brvité alebo pritlačene až šikmo odstávajúco chlpaté. Hlávka s (1—) 3—6 (—8) kvetmi. Listene široko vajcovité, vajcovité až kopijovité. Kvetné stopky 1—2 mm dlhé. Kalich zvonkovitý, 3—8 mm dlhý, zelený, holý, brvitý alebo chlpatý; kališné zuby trojuholníkovité alebo kopijovité, kratšie, \pm také dlhé alebo o málo dlhšie ako kališná rúrka. Koruna 10—16 mm dlhá, bledožltá, žltá až žltkovožltá, lupeň striešky a krídel niekedy červenkastý až červený, za sucha špinavožltá, zelená až tmavomodrá, nevoňavá alebo slabo voňavá; lupeň striešky \pm taký dlhý ako široký, \pm taký dlhý ako nechtík, na vrchole zaokrúhlený alebo slabo vykrojený; krídla o málo kratšie, člnok tupý. Struk podlhovasto čiarkovitý až čiarkovitý, (16—) 21—37 (—42) \times (2,5—) 2,6—3 (—4) mm veľ-