

Pannonicum. 8. Trňa, medzi vrcholom Rozhľadňa (Csokás) a „Közös hegy“ (Domin 1932a: 321). — Trňa, vrch Rozhľadňa (Domin et Sillinger 1932 PRC; Chrtková 1965 PR).

Carpaticum. 19. Košický Klečenov E (Futák 1958 SAV). 20. Viac lokalít v území Krivoš-
tanka — Porúbka — Humenné a v okolí obce Vinné. — Belá nad Cirochou (Soják 1957 PR).
— Jovsa, v okolí. — Remetské Hámre (oba údaje Michalko 1957). — Choňkovce (Šourek
1956, 1965 PR; Michalko Geobot. Pom. Poh. Vihorlat, p. 137, 1957). — Koňuš (Michalko
l. c.; Michalko 1960). — Koromfa (Buček 1930 BRNU, PRC, PR). — Petrovce (Michalko
l. c.). 31. Dara SE. — Ruský Potok NW, Malý Bukovec (oba údaje Šmida 1964 SAV).

LITERATÚRA

Uhrová, A.: Revision der Gattung *Coronilla* L. Beih. Bot. Cbl. 53, Abt. B, 1: 1—174, 1935.
Schmidt, B.: Beiträge zur Kenntnis der Sippenstruktur der Gattung *Coronilla* L. Feddes Re-
pert. 90: 257—361, 1979.

Hippocrepis L.

Podkovka

(SPRACOVALA A. CHRTKOVÁ, UPRAVILA M. JASIČOVÁ)

Hippocrepis comosa L.

Podkovka chocholátá

Ic.: Tab. 16, fig. 5, p. 360

Hippocrepis comosa L. Sp. Pl. ed. 1, p. 744, 1753.

Syn.: *Hippocrepis perennis* Lam. — *Coronilla depressa* Kit. in Jáv.

U nás len

subsp. *comosa*

Podkovka chocholátá pravá

Trváca bylina alebo poloker. Podzemok hrubý, rozkonárený, viachlavý. Stonka poliehavá alebo vystúpavá, na báze drevnatá, rozkonárená, tenká, oblá, 10—30 (—40) cm dlhá, holá alebo roztrúsene pritlačene chlpatá. Prílistky vajcovité, končíste, 3—4 mm dlhé, voľné alebo len na báze spojené s listovou stopkou, kožovité až blanité. Listy nepárne perovito zložené, dlhostopkaté, stopky 2—6 (—8) cm dlhé, s (3—) 4—6 (—7) jarmami lístkov. Lístky krátko-stopôckaté, stopôčky ± 1 mm dlhé; čepielky obrátene vajcovité, podlhovasté až