

- 1b Listy vajcovite kopijovité na okraji zúbkaté, lupienky nechtíkové, celistvé, semenník, hypanthium a kalich chlpaté *C. elegans*

Clarkia pulchella Pursh

Clarkia spanilá

Clarkia pulchella Pursh Fl. Amer. Sept. I. tab. 11, 1914.

Bylina, 30—60 (—90) cm vysoká. Listy čiarkovité alebo čiarkovite kopijovité, celistvookrajové, na vrchole končisté. Semenník, hypanthium a kalich holé. Lupienky beznechtíkové, 3-laločné, ružové až purpurové. Plod viacsemenná tobolka.

Chromozómy: $2n =$

Biológia, pôvod: Kvitnutie jún—september. Pochádza zo západnej časti Severnej Ameriky a do Európy bola dovezená r. 1826. Pestuje sa s kvetmi v rozmanitých farebných odtieňoch v rôznych záhradných varietách a formách.

Clarkia elegans Douglas

Clarkia pôvabná

Clarkia elegans Douglas in Lindley Bot. Reg. 16, tab. 1575, 1830.

Bylina, 50—60 cm vysoká. Listy vajcovite kopijovité, na okraji zúbkaté, na vrchole končisté. Semenník, hypanthium a kalich chlpaté. Lupienky nechtíkové, celistvé, na okraji zúbkaté alebo kučeravé, purpurové. Plod viacsemenná tobolka.

Chromozómy: $2n =$

Biológia, pôvod: Kvitnutie jún—august. Pochádza ako predchádzajúci druh zo západnej časti Severnej Ameriky a je pravdepodobne dovezená z Kalifornie okolo r. 1835. Pestuje sa v rôznych zväčša plnokvetých záhradných varietách a formách.