

PRC; Svobodová l.c.; Holubičková et Kropáčová Veg. Pom. Okres. Štúrovo, p. 305, 307, 1958; Májovský 1957 SLO). – Patince (Uhríková et Májovský in Löve Á. (ed.) Taxon 27: 379, 1978). – Nesvady. – Imeľ. – Bajč (všetko Berta 1966). – Nové Zámky (Futák 1958 SAV). – Šrobárová. – Virt. – Radvan nad Dunajom (všetko Berta 1965 SAV). – Modrany (Klokner 1974). – Strekov (Osvačilová 1951). – Rúbaň, Czigledská kaplnka (Futák 1951 SAV). – Dubník (Futák 1951 SLO, l. c.). – Čenkov (A. Kerner l. c. p. 164; Feichtinger 1899: 307; Holubičková et Kropáčová l. c.). – Jurský Chlm (Májovský 1956 SLO; Svobodová l. c.). – Mužla (Májovský 1980 SLO). – Nána. – Štúrovo (obe Holubičková et Kropáčová l. c.). – Belianske kopce, Nový dvor [A. Kerner l. c.; Jurko Biológia (Bratislava) 17: 381, 1962; Klokner 1974]. – Gbelce. – Kamenný Most (Feichtinger l. c. p. 115; Futák 1951 SLO, l. c.). – Kamenín, násyp Hronu (Svobodová l. c.). – Bfňa (Weber 1935 BRA; Domin et Jirásek 1936 PRC; Holubičková et Kropáčová l. c.). – Kozárovce (Májovský 1954; Bosáčková 1956 BRA).

Carpaticum. 10. Pezinok, Cajlanská dolina: Pernecká cesta (Holuby 1900, 1901, 1911 BRA, Zozn. Rast. Cievn. Okol. Pezin. p. 77, 1956), novšie údaje nik nepotvrdil. 12. vrch Zobor (Vlach 1935 PRC, Scheffer 1923 SLO; Svobodová Zprávy Českoslov. Bot. Společn. Českoslov. Akad. Věd 8: 62, 1973).

Všeobecný údaj. V Nitrianskej župe, na skalách a holých stráňach (Borbás 1899a: 355).

## LITERATÚRA

Coincy, A. de: Sectionnement de genre *Echium*. Actes de Congres intern. de Botanique. Paris. p. 346–351, 1900.

Klotz, G.: Die *Echium* Arten der ČSSR. Wiss. Z. Martin – Luther Univ. Halle Wittenberg, Math. Naturwiss. Reihe 12/2: 137–141, 1963.

## 8. *Pulmonaria* L.

### Plúcnik

(SPRACOVALI J. MÁJOVSKÝ, Z. HEGEDŮŠOVÁ)

Trváce byliny. Podzemky ± plazivé, rozkonárené, ± horizontálne alebo krátke, viachlavové. Stonky vystúpavé až vzpriamené, jednoduché, podobne ako listy rôznym spôsobom riedko alebo husto mäkko alebo drsno srstnaté až štetinaté, ± husto žliazkaté. Prízemné (letné) listy najčastejšie odlišné od byľových, zblížené do ružice, ± dlho stopkaté, veľké, často škvornité alebo bez škvŕn, vyvíjajú sa až po odkvitnutí, stonkové listy ± poloobjímavé alebo sediace so zúženou, ± zaokrúhlenou bázou, nezbiehavé alebo len krátko až nezreteľne zbiehavé. Súkvetie z dvojzákinkov na vrchole stonky alebo bočných konárov v pazuchách listeňov. Kalich spočiatku rúrkovitý, takmer do polovice 5-zárezový, neskôr ± zvončekovitý, zaobleno hranatý v čase plodu zväčšený. Koruna lievikovitá, červená, modrá, fialová alebo azúrová, v ústí korunnej rúrky s prstencom chlupov. Tyčinky s krátkymi nitkami, pripojené k hornej alebo dolnej časti korunného hrdla. Čnelka s bliznami vždy uzavretá v korune, výrazne heterodistylická. Tvrdky šikmo vajcovité, tmavohnedé až čierne, chlpkaté, hladké, lesklé, golierik hladký, prsteňovitý.