

Ide o druh veľmi podobný *A. officinalis*. Odlišuje sa hustejšími závinkami, plytko delenými kalichmi, sivo plstnatými listami a byľami s drobnými kvetmi. Druh je pravdepodobne hybridogénneho pôvodu (*A. officinalis* × *A. ochroleuca* alebo *A. officinalis* × *A. leptophylla*), jeho taxonómia si vyžaduje ďalšie štúdium.

LITERATÚRA

- G u s u l e a c, M.: Beiträge zur Systematik der Anchusen. Publ. Soc. Nat. Romania 6: 78–92, 1923.
 G u s u l e a c, M.: Die europäischen Arten der Gattung Anchusa L. Bul. Fac. Sti. Cernauti I (1): 73–123, 1927.
 G u s u l e a c, M.: Species Anchusae generis L. hujusque cognitae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 286–322, 1929.
 G u s u l e a c, M.: Zur Nomenklatur der Anchusa officinalis L. und Anchusa italica Retz. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 81–84, 1929.
 T a u s c h, I. F.: Bemerkungen über Anchusa angustifolia und einige minder bekannte Arten. Flora 7: 225–235, 1824.

14. Lycopsis L.

Přhlica

(SPRACOVALI L. BERTO VÁ, J. BERTA)

1. *Lycopsis arvensis* L.

Přhlica roľná

Lycopsis arvensis L. Sp. Pl. ed. 1, p. 139, 1753.

Syn.: *Anchusa arvensis* (L.) B i e b.

U nás len

subsp. *arvensis*

Přhlica roľná pravá

Syn.: *Lycopsis arvensis* L. subsp. *occidentalis* K u s n.

Jednoročná alebo dvojročná byľina, celá riedko odstávajúco štetinatá, štetiny cibulkovité. Byľ priama alebo vystúpavá, jednoduchá alebo už od bázy rozkonárená, valcovitá, (10–)20–40(–60) cm vysoká. Listy striedavé ± v 2 radoch, prízemné stopkaté, byľové sediace, poloobjímavé, podlhovasto kopijovité, úzko kopijovité alebo čiarkovité, plytko vykrajované alebo riedko zúbkaté, na vrchole tupé alebo končisté, 5–10(–15)×1–1,5 cm veľké, rovnomerne štetinaté bez zjavných bočných žíl. Súkvetie metľina zložená z krátkych, ± chudobných závinkov. Kvety ± súmerné kratučko stopkaté. Kalich až ku báze strihaný, segmenty kalicha kopijovité, 4–5 mm dlhé, v čase