

Carpaticum. 9. Pod Javorinou (Holuby 1871a: 30). Dubová (Neuhäuslová-Novotná Stud. Českoslov. Akad. Věd 7: 126, 1970). 11. Modrová (Mucina Folia Geobot. Phytotax. 16/3: 242–244, 250–252, 1981). – Záhřady (Joh. Hruby 1942: 123). 12. Skýcov, Vápenný vrch (Kováčiková 1974). 13. Rožnové Mitice (Futák 1960). – Oslany (Scheffer 1918; Domin 1949). – Oslany – Kršany (Scheffer 1920). 14e. Bátovce. – Pietavec (Kupčok Biol. Práce Slov. Akad. Vied 2/9: 36, 1956). – Krnišov, Tepličky (Kmeť 1876 BRA). 30a. Janovník (J. Michalko 1976). 30c. Čičava E. – Merník W. – Vyšný Žipov (všetko E. Králík 1977).

Pochybný údaj. 26b. Kežmarok (Sagorski et Schneider 1891: 437).

Úžitkovost'. Je jednou z najstarších liečivých rastlín. Vňať obsahuje glykozidické horčiny, májmä marubiín, menej triesloviny a silice. Pôsobí sekretolyticky, expektoračne, horčiny podporujú vylučovanie žlče. Vo farmaceutickom priemysle sa používa ako prímies do čajovín užívaných pri chorobách dýchacích ciest, žlčníka, ako aj pri arytmií srdca. V ľudovom liečiteľstve má široké uplatnenie.

1. × 2. *Marrubium peregrinum* × *M. vulgare*

Marrubium × *paniculatum* Desr. in Lam.

Jablčník metlinatý

Marrubium × *paniculatum* Desr. in Lam. Encycl. Méth. Bot. 3: 716, 1792.

Syn.: *Marrubium pannonicum* Reichenb. fil. – *M. remotum* Kit.

Dobre, najmä v prírode, poznateľný kríženec. Typické rastliny, majú intermediárny charakter jednotlivých znakov, najnápadnejší je celkový habitus, tvar listov a postavenie kališných zubov.

Kríženec je rozšírený hojne až roztrúsene po celej panónskej oblasti. Všade tam, kde sa vyskytujú rodičia pokope. Jeho výskyt možno s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať v ich blízkosti.

7. Hesiodia Moench

Ránhoj

(SPRACOVAL B. KŘÍSA, UPRAVILA K. ZAHRADNÍKOVÁ)

1. *Hesiodia montana* (L.) Dumort.

Ránhoj horský

Hesiodia montana (L.) Dumort. Fl. Belg. p. 44, 1827.

Bazionym: *Sideritis montana* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 575, 1753.

U nás len