

vrch (Jurko Sborn. Ochr. Prír. Západoslov. Kraji, p. 64, 1962; Futák 1947, 1973 SAV). 11. Viac lokalít. 12. vrch Zobor (Vlach 1929: 271–273 Šágyová 1975). – Jelenec, hradný vrch (Záborský 1970 SLO; Šípová-Kováčiková Acta Bot. Slov. A. Suppl. 5: 72, 1979; Eliáš Zprávy Českoslov. Bot. Společn. Českoslov. Akad. Věd 11: 46, 1976). – Čeladince, vrch Hradovička (Šípová-Kováčiková l. c.). 13. Viac lokalít. 14e. Bohunice. – Bátovce. – Pukanec. – Prenčov, Bralo (všetko Hlaváček CHKO Štiav. vrchy, p. 523, 1985). 15. Tisovec, vrch Červená (Hendrych Preslia 27: 66, 1955). – Vrbica W, NW (Šmíd 1973). 16. Suché doly. – Hradová. – Kašter. – Furmanec. – Čremošná. – Okrúhla skala (všetko Hendrych Acta Univ. Carol., Biol. 1967: 126, 189, 1968). 22. Ondrej – Medzibrod (Futák 1933 SAV).

## 8. Melittis L.

### Medunka

(SPRACOVAL K. MARHOLD)

#### 1. *Melittis melissophyllum* L.

#### Medunka medovkolistá

*Melittis melissophyllum* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 597, 1753.

#### U nás len

subsp. *carpatica* (Klokov) P. W. Ball

#### Medunka medovkolistá karpatská

Ic.: Tab. 24, fig. 2, p. 237

*Melittis melissophyllum* L. subsp. *carpatica* (Klokov) P. W. Ball J. Linn. Soc. – Bot. 64: 71, 1971.

Bazionym: *Melittis carpatica* Klokov Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S. S. R 18: 213, 1957.

Syn.: *Melittis subcordata* Klokov – *Melittis grandiflora sensu* Klokov non Sm. in Sm. et Sowerby – *Melittis grandiflora* Sm. in Sm. et Sowerby emend. Soó – *Melittis carpatica* Klokov emend. Soó

Trváca, slabo medovo voňajúca bylina. Stonka priama väčšinou jednoduchá, štvorhranná, 20–60 cm vysoká, odstávajúco srstnato chlpatá. Listy stopkaté, stopky 0,5–2,5 cm dlhé, husto chlpaté, čepele elipsovité, podlhovasto elipsovité, vajcovité až široko vajcovité, na báze klinovité, zaokrúhlené až srdcovité, na okraji pílkovité až vrúbkované, najväčšie listy na okraji s (15–)20–27 (–35) zubmi, (5,5–)6,5–12,5 cm dlhé, na oboch stranách (na rube len na žilách) krátko odstávajúco chlpaté. Kvety 30–40 (–45) mm dlhé, po 1–6 v pazuchách 2–6 horných listových párov na 0,5–1,0 cm dlhých odstávajúco dlho žliazkaty chlpatých stopkách. Kalich široko zvončekovitý, nepravidelne dvojpyskový, 1,5–2,0 cm dlhý, najmä na báze husto dlho (až 2,5 mm) odstávajúco žliazkaty chlpatý, 10-žilový, väčšinou so 4 široko trojuholníkovitými zubmi, zuby