

horný pysk koruny vyklenutý, 4–6 mm dlhý, celistvookrajový, páperistý, bočné laloky malé, čiarkovité, dolný pysk obrátene srdcovitý, 2 mm dlhý. Nítka tyčínok chlpatá, peľnice fialové. Tvrdky vajcovito tetraedrické, 2–2,5 mm dlhé, sivé.

Chromozómy: $2n = 18$, okr. 6, Bratislava (Uhríkovi in Májovský et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comeniana, Bot. 25: 9, 1976).

Biológia, ekológia, fytoecológia. Terofyt (hemikryptofyt). Kvitnutie marec–september. Burina, ktorá sa vyskytuje na takmer všetkých na dusík bohatých stanovištiach antropického pôvodu. Rastie v záhradách, na poliach, vo viniciach, na medziach, smetiskách, rumoviskách, pri plotoch a múroch, od planárneho do montánneho stupňa v spoločenstvách zväzov *Sisymbrium*, *Onopordion acanthii* a radu *Polygono-Chenopodietalia*,

Rozšírenie na Slovensku. Hojná na celom území, v nižších polohách a teplejších oblastiach veľmi hojná.

4. *Lamium amplexicaule* L.

Hluchavka objímavá

lc.: Tab. 25, fig. 3, p. 250

Lamium amplexicaule L. Sp. Pl. ed. 1, p. 579, 1753.

Syn.: *Pollichia amplexicaulis* Willd. – *Galeobdolon amplexicaule* Moench – *Lamiopsis amplexicaulis* Opiz

Jednoročná, 10–25(–30) cm vysoká, riedko až husto páperistá bylina. Byl' od bázy rozkonárená, vystúpavá alebo priama. Dolné listy dlho stopkaté, okrúhlasté alebo srdcovito obličkovité, na okraji hrubo vrúbkované až plytko tupo laločnaté, na vrchole zaokrúhlené, 7–20(–25) mm dlhé. Horné listy a listene sediace až poloobjímavé, obličkovité. Listene 3–4 mm dlhé. Paprasleny ± oddialené, kvety sediace. Kalich 5–7 mm dlhý, odstavajúco chlpatý, zuby kratšie ako rúrka kalicha, v čase plodu k sebe sklonené. Koruna 10–20 mm dlhá, ružová až ružovopurpurová, rúrka koruny rovná, dlhšia ako kalich, bez prstenca chlpatý, horný pysk koruny 3–5 mm dlhý, celistvookrajový, bočné laloky zakrpatené alebo chýbajú, dolný pysk obrátene srdcovitý, 1–2,5 mm dlhý. Často sa vyskytujú menšie zatvorené kleistogamické kvety. Nítka tyčínok holé, peľnice žlté. Tvrdky pyramidálne vajcovité, ± 3 mm dlhé.

Chromozómy: $2n = 18$, okr. 6, Dvorníky (Féráková et Uhríkovi in Májovský et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comeniana, Bot. 18: 54, 1970).

Biológia, ekológia, fytoecológia. Terofyt. Kvitnutie marec–september. Nitrofilný burinný druh, bežný vo viniciach, záhradách, na smetiskách, úhoroch, násypoch a pod. Rastie na výhrevných, skyprených, ľahších pôdach od planárneho do submontánneho stupňa v spoločenstvách tried *Secalinetea*, *Stellarietea mediae*, radu *Polygono-Chenopodietalia* a zväzu *Sisymbrium*.

Rozšírenie na Slovensku. Druh veľmi hojný v nížinách a pahorkatinách, vo vyšších polohách zriedkavejší.