

Kľúč na určenie druhov

- 1a Spravidla všetky listy po celý rok s veľkými zreteľnými striebrostobielymi škvrnami na 1/2–3/4 plochy čepele. Byť v hornej časti nepravidelne priečne vráskovitá. Horný pysk koruny široko elipsovité, 8–10 mm široký, na okraji dlho brvitý, brvy 1,2–1,8 mm dlhé. Kalich v čase plodu 12–14,5 mm dlhý. Tvrdky 4,2–5,3 mm dlhé 3. *G. argentatum*
- 1b Listy bez striebrostobielych škvŕn, alebo škvrny len na niektorých listoch, nie po celý rok, plošne menšie. Byť v hornej časti hladká. Horný pysk koruny elipsovité, 6–8 mm široký, na okraji krátko brvitý, brvy 0,7–1,3 mm dlhé. Kalich v čase plodu 8–12 mm dlhý. Tvrdky 2,6–4,2 mm dlhé 2
- 2a Byľové listy vajcovité, 1–2-krát vrúbkované až vrúbkovane pílkovité, najviac 2-krát také dlhé ako široké, iba o málo dlhšie ako paprasleny. Paprasleny v počte 2–4(–5), 4–8-kveté 1. *G. luteum*
- 2b Byľové listy vajcovito kopijovité, dlho končisté, 1–2-krát vrúbkované až pílkovité, 2–4-krát také dlhé ako široké, oveľa dlhšie ako paprasleny. Paprasleny v počte 3–7(–10), 8–14-kveté 2. *G. montanum*

1. *Galeobdolon luteum* Hudson emend. J. Holub

Hluchavník žltý

Galeobdolon luteum Hudson Fl. Angl. ed. 2, p. 258, 1778 emend. J. Holub Folia Geobot. Phytotax. 5: 80, 1970.

Syn.: *Galeopsis galeobdolon* L. – *Lamium galeobdolon* (L.) L.; (L.) Nath. – *Lamiastrum galeobdolon* (L.) Ehrend. et Polatschek – *Pollichia vulgaris* Pers. – *Galeobdolon vulgare* (Pers.) Pers. – *Lamium vulgare* (Pers.) Fritsch – *L. luteum* (Hudson) Krockner – *Galeobdolon luteum* Hudson subsp. *luteum* – *Lamium galeobdolon* (L.) L. subsp. *galeobdolon* – *L. galeobdolon* (L.) L. subsp. *vulgare* (Pers.) Hayek; (Pers.) Hyl. – *Lamiastrum galeobdolon* (L.) Ehrend. et Polatschek subsp. *galeobdolon* – *Galeobdolon luteum* Hudson var. *tatrae* Ull. – *Lamium galeobdolon* (L.) L. var. *vulgare* (Pers.) Briq.

Rastlina (10–)15–35(–40) cm vysoká, po odkvitnutí vytvára poplazy. Listy poplazov okrúhle alebo široko vajcovité, na báze zaokrúhlené alebo srdcovité, na okraji pravidelne vrúbkované až vrúbkovane pílkovité, terminálny zub zaokrúhlený až utatý, 3–4 cm dlhé. Byť vystúpavá, v dolnej časti, najmä na hranách nadol pritlačene chlpatá, v hornej časti hladká. Listy prezimujúce, na líci zelené alebo len s drobnými až väčšími striebrostobielymi škvrnami, trvajúcimi iba prechodný čas, na rube spravidla tmavofialové. Byľové listy vajcovité, 1–2-krát vrúbkované až vrúbkovane pílkovité, 1–3(–3,5) cm dlhé, 1–1,5(–2)-krát také dlhé ako široké, iba o málo dlhšie ako paprasleny, dolné vajcovité až široko vajcovité, na báze srdcovité, horné vajcovité až vajcovito kopijovité. Listene na báze utaté, pravidelne 1–2-krát vrúbkované až vrúbkovane pílkovité, zriedka pílkovité, na vrchole zaokrúhlené, okraj dolných a horných listov ± rovnaký, 1,5–3,5(–4) cm dlhé, rovnako dlhé ako široké alebo 2-krát také dlhé ako široké, kratšie alebo najviac také