

Bot. 21: 57, 1973). – Slizké (M a g i c 1967). – Valkovo údolie Slatiny (D o m i n 1936). – 18. Kamenná Baba. – Lipovce W [obe O s v a č i l o v á Biológia (Bratislava) 9: 369, 1954]. 20. Morské oko (B e h r e n d s e n 1876: 682; D i e t z A. 1882: 183). 21a. Rajec. – Nedožery (obe J. K n a p p 1865b: 141). 21c. Jakub – Harmanec (Herbár Seminára Banská Bystrica sec. F u t á k I. c.). 30c. Lubiša S – Hankovce (S o j á k Preslia 31: 311, 1959). – Palota, chata – kóta 698 (D o m i n 1940a: 41). 31. Stakčín. – Ulič NE, pri potoku Ulička (obe B e h r e n d s e n I. c.) Kolbasov – Ulič (B e h r e n d s e n I. c.; J. M i c h a l k o 1954).

P o z n á m k a . Výskyt druhu je na ústupe najmä v odvodnených oblastiach.

Ú ž i t k o v o s ť . V stredoveku vysoko cenená liečivá rastlina. V súčasnej medicíne sa *Herba gratiolarum* užíva veľmi opatrne, jej účinky nie sú dostatočne známe. Je považovaná za jedovatú. V ľudovom liečiteľstve sa používa ako silné laxatívum, diuretikum, ako aj pri psychických poruchách.

O c h r a n a . Patrí do kategórie veľmi ohrozených druhov slovenskej flóry EN a vyžaduje ochranu.

4. Lindernia A 11 .

Lindernia

(SPRACOVALI K. ZAHRADNÍKOVÁ, H. OŤAHELOVÁ)

Syn.: *Vandellia* L. 1767 p. p.

1. *Lindernia procumbens* (K r o c k.) P h i l c o x

Lindernia puzdierkatá

Lindernia procumbens (K r o c k.) P h i l c o x Taxon 14: 30, 1965.

Bazionym: *Anagalloides procumbens* K r o c k. Fl. Siles. 2, p. 398, 1790.

Syn.: *Lindernia pyxidata* L. 1771 p. p. – *L. gratioides* auct. non L l o y d et F o u c. 1886: H a y e k – *Gratiola inundata* K i t. ex S p r e n g. 1813 – *Vandellia erecta* B e n t h. 1835 – *V. pyxidaria* M a x i m. 1875.

Jednoročná, 5–15(–18) cm vysoká bylina s nepatrnými žliazkatými chlpkami (lupa) a s početnými tenkými korienkami. Byl vzpriamená, od bázy rozkonárená, 4-hranná, konáre vystúpavé alebo poliehavé. Listy protistojné, sediace, elipsovité alebo podlhovasto elipsovité, celistvookrajové alebo slabo vrúbkovane pílkovité, na vrchole tupé, 20×10 mm veľké, zelené alebo modrastozelenkasté, pri žilách žliazkaté chlpaté, v dolnej časti byle niekedy na báze mierne zúžené. Kvety stopkaté, jednotlivé v pazuchách listovitých listeňov, kvetné stopky tenké, oblú 8–10(–20) mm dlhé, oveľa dlhšie ako listene. Kvety obyčajne kleistogamické 2,5–4 mm dlhé, s korunou uzavretou a pretrvávajúcou na plode, zriedkavejšie chazmogamické, 5–6 mm dlhé, s korunou otvorenou a opadavou. Kalich strihaný na 5 segmentov, segmenty čiarkovito kopijovité, na okraji jemne zúbkaté alebo brvité. Koruna dvojpysková, horný pysk dvojlaločný svetloružový, dolný 3-laločný žltkastý, rúrka koruny biela. Tyčinky 4, dvojmocné, všetky fertillné, 2 predné sediace v ústí korunnej rúrky, 2 zadné v hornej polovici korunnej rúrky. Semenník vajcovitý, na báze so žlaznatým