

Pannonicum. **6.** Bratislava (Mergl 1904 SAV; Javorčíková in Májovský Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Bot. 26: 22, 1978). – Bratislava, časť Dúbravka, Klimkovičova ulica (Peniašteková 1996). – Piešťany (V. Frič 1937 PR; Mucina Zprávy Českoslov. Bot. Společn. Českoslov. Akad. Věd 22/1: 53, 1987; Šípošová 1988 SAV).

Carpathicum. **10.** Bratislava, Rybársky cech. – Bratislava, hradný vrch, pod Zámockými schodami (obe Letz 1995 SAV). – Bratislava, Židovská ulica (Šípošová 1997 SAV). – Bratislava, Beblavého ulica (Hodoval 1973 SLO). – Bratislava, Červený Kríž (Dlabáčová 1933 PRC). – Bratislava, Horský park, Gorazdova ulica (Tavoda et Mráz 1997 SAV). **14c.** Kremnica (Šípošová 1985; Jarolímek in Valachovič et al. Rastl. Spol. Slov. 1. Pion. Veget., p. 33, 1995). **15.** Revúca (Hodálová et Peniašteková 1988; Valachovič et Hodálová in Valachovič et al. l. c.). **26a.** Ružomberok, v meste (Slavík in Hejný Preslia 43/1: 46, 1971). **25.** Žilina, Legionárska ulica (Letz 1996 SAV). **26b.** Levoča (Greschik 1927 PRC). **29.** Prešov, Moyzesova ulica. – Prešov, ulica Slovenskej Republiky Rád (obe L. Dostál Zborn. Východoslov. Múz. v Košiciach 28: 64, 1978).

2. *Cymbalaria pallida* (Ten.) Wettst.

Címbalok bledý

Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. 4 (3b), p. 58, 1891.

Bazionym: *Linaria pallida* Ten. Fl. Nap. 1, p. 259, 1811–1815.

Trváca, chlpatá až plstnatá bylina. Byl plazivá, 20 cm dlhá, články v strednej časti byle veľmi dlhé, v hornej časti kratšie, takže dlhostopkaté listy prevyšujú vrchol byle. Listy zväčša protistojné, okrúhle až priečne okrúhlasté, celistvookrajové alebo plytko laločnaté, 25×30 mm veľké. Kalich 2–3 mm dlhý, husto plstnatý. Koruna veľká, 15–30 mm dlhá, s 9 mm dlhou ostrohou, svetlo fialovomodrá.

Pôvodný v Taliansku, na Slovensku zriedkavo pestovaný. Rozmnožuje sa semenami a vegetatívne úlomkami podzemku a ľahko splnieva.

13. Kickxia Dumort.

Oštepovka

(SPRACOVALA E. MICHALKOVÁ)

Jednoročné byliny. Korene tenké, málo rozkonárené, svetlo sivohnedé. Byle poliehavé, od bázy rozkonárené, tenké, oblé, holé až odstavajúco chlpaté, rozprestreté až vystúpavé. Listy krátkostopkaté, v dolnej časti byle protistojné, smerom k vrcholu striedavé až jednoradové, čepele celistvookrajové. Kvety jednotlivé, v pazuchách listov. Kvetné stopky (5–)1,5–3 mm dlhé. Kalich 5-dielny. Koruna šklabivá, rúrka koruny na báze s ostrohou, čnelka na tobolke krátka, holá, sivohnedá. Tobolka viečkatá, kruhovito pukajúca, semená svetlohnedé, vráskované.

Taxonomická poznámka. Niektorí autori (napr. Dostál 1989) uvádzajú zastúpenie *K. elatine* subsp. *crinita* (Mabille) Greuter. Výskyt tohto stenomediteránneho taxónu sa však na našom území nepotvrdil (Michalková 1995).