

2. *Kickxia elatine* (L.) Dumort.

Oštepovka obyčajná

Kickxia elatine (L.) Dumort. Fl. Belg. p. 35, 1827.

Bazionym: *Antirrhinum elatine* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 612, 1753.

Syn. *Linaria elatine* (L.) Mill. 1768 – *Elatine hastata* Moench 1794.

U nás len

subsp. *elatine*

Oštepovka obyčajná pravá

Ic.: Tab. 10, fig. 1, p. 125

Byť 19–55 cm dlhá, holá až roztrúsene chlpatá. Listy aspoň niektoré na báze oštepovité, 8–26 mm dlhé, čepele aj stopky listov holé až roztrúsene chlpaté. Kvetné stopky 15–30 mm dlhé, holé až roztrúsene chlpaté, najmä pod kalichom. Diely kalicha kopijovité, ostro končisté, holé až roztrúsene chlpaté. Koruna 9–10 mm dlhá, holá, horný pysk fialový, dolný pysk žltkastý, ostroha rovná, 5–6 mm dlhá, holá. Tobolka svetlo sivohnedá.

Chromozómy: $2n=36$, okr. 12, Žibrica (Hindáková et Schwarzová in Á. Löve (ed.) Taxon, 29: 728, 1980).

Biológia, ekológia, fytoecenológia. Terofyt. Kvitnutie jún–september. Dlhý koreň (do 0,5 m) umožňuje rast na suchých, obrábaných pôdach. Poddruh s pomerne širokou ekologickou amplitúdou. Uprednostňuje teplejšie, sorbčne nasýtené, neutrálne až mierne kyslé pôdy. V súčasnosti vzácne rastie v planárnom a kolínnom stupni. Primárne sa viaže na teplomilné burinové spoločenstvá radu *Centaureetalia cyani*, optimum má vo zväze *Scherardion*. Sekundárne rastie v ruderálnych fytoecenózach.

Floristický element: submediteránno-subatlantický.

Celkové rozšírenie. Rastie v južnej, západnej a strednej Európe, na sever zasahuje do Anglicka, na východe po pohorie Krym a na juhu do severnej Afriky. Na americkom kontinente je zavlečený.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 20. Výskyt zaznamenaný vo všetkých okresoch panónskej flóry, v okresoch obvodu predkarpatskej flóry okrem Muránskej planiny, Slovenského raja a Slanských vrchov. Na ostatnom území v okresoch Vihorlat, Nízke Tatry, Spišské kotliny, Západné Beskydy, Nízke Beskydy a Bukovské vrchy. Recentne sa zistil v Ipelsko-rimavskej brázde, Záhorskej nížine, Podunajskej nížine, Južných Bielych Karpatoch, Trábeči, Vtáčniku, Kremnických vrchoch a v Bukovských vrchoch. (Podrobný zoznam lokalít pozri Michalková et Hegedúšová 1993).

Pannonicum. 1. Kamenica nad Hronom (Májovský 1959 SLO). – Kováčov – Chľaba (obe Sillinger et Deyl 1930 PRC). – Chľaba (Domín 1920). – Bajtava NE (Kropáč in Hejný et Kropáč Preslia 1: 45, 1975). 2. Plášťovce. – Divín – Mýtna. – Lučenec – Halič. – Kalinovo. – Fiľakovo SW (všetko E. Michalková 1992 SAV) a viac starších údajov. 3. Plešivec (Deyl 1961 PR). – Domica (Krajina 1933 PR). – Hrhov. – Zádielska dolina (obe