

Nejasný údaj. 13. Vrchol Strážova (Runkovič 1982) – doteraz odtiaľ nikdy neuvádzaný. 22. Pramene Lúčianky, 1750 m (? Domin 1932 PRC).

### 5. *Pedicularis palustris* L.

Všivec močiarny

Ic.: Tab. 33, fig. 2, p. 429

*Pedicularis palustris* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 607, 1753.

Dvojiročná, niekedy jednoročná bylina. Hlavný koreň obrátene kužeľovitý, málo rozkonárený, vedľajšie korene biele. Byl dutá, priama, oblá, zbíhavými okrajmi listov trocha rebernatá, spravidla bohato rozkonárená, (5–)20–50(–80) cm vysoká, s priamo alebo šikmo odstávajúcimi konármi, bez poliehavých bočných bylí, v dolnej časti holá, v hornej (osobitne v blízkosti uzlov) slabo chlpatá, pomerne husto listnatá. Listy zvyčajne striedavé, vzácne protistočné alebo v praslenoch, stopkaté, v obryse vajcovito kopijovité, trojuholníkovito kopijovité až čiarkovito kopijovité, ± dvojito perovito strihané alebo perovito dielne, 2–6(–8) cm dlhé, často červenkasté; úkrojky elipsovité, podlhovasté až vajcovito kopijovité, dosť hlboko vrúbkovane pílkovité až nepravidelne perovito zárezové alebo až perovito strihané, len na hlavnej žile riedko chlpaté, zuby bielo chrupkovito končisté; stopky krátke, rozšírené, dlho chlpaté. Súkvetie riedke klasovité strapce, v dolnej časti často prerušované, bohato listnaté, predĺžené, v dolnej časti redšie, v hornej časti nakopenejšie, so striedavými listeňmi a kvetmi. Dolné listene listovité, ± také dlhé ako kvety; horné listene holé alebo na rube málo chlpaté, oveľa kratšie ako kvety, v obryse trojuholníkovité, perovito dielne alebo perovito strihané, s 3 úkrojkami, dolné úkrojky predĺžené a hlboko laločnaté; stopka veľmi rozšírená, dole kučeravo chlpatá, zbíhavá. Stopky kvetov až 5 mm dlhé, horné kvety ± sediace. Kvety šikmo alebo často aj rovnovážne odstávajúce. Kalich vajcovitý, v čase kvetu nafúknutý, hlboko dvojpyskový, 9–12(–13) mm dlhý, do ± 1/3 deľný, mnohorebrový, riedko chlpatý, na povrchu holý alebo s ojedinelými dlhými chlpmi, na okraji hustejšie chlpatý s dlhými sprehybanými chlpmi, často červenkastý; zuby po 2 zrastené, vrúbkované, chrbtový zub zakrpatený. Koruna 15–23(–25) mm dlhá, holá, ružovofialová až červenofialová, zriedka biela, takmer dvakrát dlhšia ako kalich; rúrka koruny priama, z kalicha dosť vyčnievajúca; horný pysk rovný, prilba vpredu s krátkym utatým zobáčikom, popri páre vrcholových zubov v polovici dĺžky okraja s ďalším párom nitkovitých, až 1 mm dlhých zubov; dolný pysk ± rovnako dlhý ako horný pysk, 3-laločný, na okraji krátko brvitý, laloky okrúhlasto vajcovité, stredný lalok zreteľne menší ako bočné laloky, ± 6 mm široký, veľmi úzkou bázou sa spája so širšími bázami bočných lalokov, bočné laloky 8–9 mm široké. Tyčinky prirastené pri báze koruny, nitky na báze chlpaté, nitky dlhších tyčiniek dlho husto chlpaté aj pod peľnicami; peľnice 2,5–3,0 mm dlhé, holé. Semenník vajcovitý, ± 3,5 mm dlhý, holý, postupne do čnelky zúžený. Tobolka kožovitá, šikmo vajcovitá, 10–14 mm dlhá, holá, od vrcholu jednostranne