

v jednej tobolke v počte 2–46, žltkasté, hnedé až čierne. Osemenie jemne pravidelne alebo nepravidelne jamkaté až vráskaté.

Kľúč na určenie druhov

- 1a Listy čiarkovité, čiarkovito kopijovité alebo kopijovité 2
 1b Listy elipsovité, vajcovité až okrúhlasté 7
 2a Jednoročné byliny. Listy 1(–3)-žilové 3
 2b Trváce byliny. Listy 3–7-žilové 4
 3a Klas riedky, dolné listene 1,5–2 mm dlhé 8. *P. tenuiflora*
 3b Klas hustý, dolné listene 15–30 mm dlhé 9. *P. aristata*
 4a Stvol hranatý, výrazne ryhovaný 5
 4b Stvol oblý, bez rýh 6
 5a Rastlina 5–40(–60) cm vysoká, stvol s 5 ryhami 4. *P. lanceolata*
 5b Rastlina (30–)40–80(–100)cm vysoká, stvol so 6–12 ryhami 5. *P. altissima*
 6a Klasy krátke, vajcovité, stvol s klasom ± taký dlhý ako listy, listy tenké
 6. *P. atrata*
 6b Klasy predĺžené, valcovité, stvol s klasom oveľa dlhším ako listy, listy mäsité
 7. *P. maritima*
 7a Laloky koruny striebrostobiele, nitky tyčiniek fialové, stvol viac ako 3-krát
 dlhší ako klas, listy sediace alebo krátko stopkaté 3. *P. media*
 7b Laloky koruny hnedasté, nitky tyčiniek biele, stvol rovnako dlhý, kratší, alebo
 až 3-krát dlhší ako klas, listové stopky ± také dlhé ako čepeľ 8
 8a V jednej tobolke 4–15 (najčastejšie 6–12) semien, čepele zväčša náhle zúžené
 do stopky 1. *P. major*
 8b V jednej tobolke 12–42 (najčastejšie 12–25) semien, čepele spravidla postup-
 ne zúžené do stopky 2. *P. uliginosa*

1. *Plantago major* L.

Skorocel väčší

Ic: Tab. 37, fig.1, p. 560

Plantago major L. Sp. Pl. ed. 1, p. 112, 1753.

Syn.: *Plantago officinarum* Crantz 1766 – *P. latifolia* Salisb. 1796.

Trváca bylina. Podzemok krátky, hrubý, s početnými adventívnymi koreňmi a jednou, zriedkavejšie s niekoľkými hustými listovými ružicami, s priemerom 4–30 cm, ružica spravidla s 5–20 listami. Listy vzpriamené alebo poliehavé, stopka listu na báze pošvovito rozšírená, rovnako dlhá alebo dlhšia ako čepeľ, čepeľ vajcovitá, široko vajcovitá alebo elipsovitá, zväčša náhle zúžená do stopky, 3–30×1–10 cm veľká, na báze srdcovitá, utatá alebo klinovitá, celistvookrajová, zvlínená alebo v dolnej tretine s oddialenými nepravidelnými zubmi, na vrchole zaokrúhlená alebo tupo končistá, 3–9-žilová, na líci holá alebo riedko páperistá, na rube až husto chlpatá.