

Celkové rozšírenie. Severná a stredná Európa.

Rozšírenie na Slovensku. Hoci sa tento taxón vo flórových dieľach udáva aj z územia Slovenska, nepodarilo sa nám jeho výskyt potvrdiť. Všetok revidovaný materiál a po niekoľko vegetačných sezón sledované populácie na halo-fytných a subhalofytných stanovištiach zodpovedali taxónu *Plantago uliginosa* subsp. *leptostachya* (Wallr.) Tackik (cf. Pěnková 1986). Prípadný výskyt tohto taxónu na území Slovenska by bol na východnej hranici jeho areálu.

2. *Plantago uliginosa* F. W. Schmidt

Skorocel barinný

Ic.: Tab. 40, Fig. 3, p. 580

Plantago uliginosa F. W. Schmidt in J. Mayer Samml. Phys. Aufsätze Böhm. Naturgesch. 1: 199, 1791.

Syn.: *Plantago minor* Gilib. 1781 non Garsault 1764 nec Fr. 1839 (nom. inval.) – *P. limosa* Kitex Schult. 1814 – *P. intermedia* Gilib. 1806 – *P. major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange 1856 – *P. scopulorum* (Fr.) Pavlova 1923 – *P. pauciflora* auct. non Gilib. 1781, nec Lam. 1791, nec aliorum: Domin 1933 – *P. major* L. subsp. *pleiosperma* Pilg. 1937.

Trvác, svetlozelená až žltozelená, často fialovastá bylina. Podzemok krátky, hrubý, s početnými adventívnymi koreňmi a spravidla s jednou listovou ružicou, s priemerom 3–40 cm, ktorú tvorí 3–30 listov. Listy poliehavé, vystúpavé alebo vzpriamené, bylinné (mäkkšie ako pri predchádzajúcom druhu), matné. Stopka listu na báze pošvovito rozšírená, rovnako dlhá alebo dlhšia ako čepeľ. Čepeľ podlhovastá, elipsovité až široko vajcovité, 1–25×0,8–20 cm veľká, na báze najčastejšie klinovité, postupne zúžená do stopky, zriedkavejšie ufatá, celistvookrajová, zvlhnená, často v dolnej tretine s nepravidelnými oddialenými zubmi alebo až lalokmi, na vrchole zaokrúhlená alebo tupo končí, 3–5(–9)-žilová, na líci redšie, na rube hustejšie páperistá alebo chlpatá. Stvoly najčastejšie v počte 1–20(–40), poliehavé, vystúpavé, zriedkavejšie vzpriamené, oblé, 1–25 cm dlhé, rovnako dlhé alebo dlhšie ako klas, na báze spravidla odstávajúco chlpaté, smerom nahor pritlačene chlpaté, niekedy až holé. Klasy valcovité, hrubé, husté alebo štíhle, na vrchole končí, 1–30 cm dlhé. Kvety jednotlivé, nenápadné v pazuche malého listeňa. Plod vajcovitá tobolka, pukajúca v dolnej tretine, oddeľovacia štrbina málo badateľná, zakrytá kalichom. Viečko zrelej tobolky v dolnej časti valcovité, v hornej časti vajcovité až kuželovité, 1,5–3 mm dlhé. V jednej tobolke 12–42, najčastejšie 12–25 semien. Semená mnohouholníkovo bochníkovité, 0,5–1,5×0,2–0,9 mm veľké, tmavohnedé až čierne, na osemeni s nepravidelnou jamkatou skulptúrou.

Kľúč na určenie poddruhov

- 1a Listy a stvoly spravidla poliehavé alebo vystúpavé, čepeľ 3–5-žilová, na okraji v dolnej tretine s viacerými malými nepravidelnými zubmi. Klasy 1–5 cm dlhé, husté, valcovité. Viečko tobolky 2–3 mm dlhé..... I. subsp. *uliginosa*