

triesloviny, glukokiníny, organické kyseliny, amíny, vitamíny, fytoncídne látky a i. Prhlivé chlpy obsahujú amíny acetylcholín, histamín a serotín. Prhl'ava je zložkou čajovín, podporuje celkový metabolizmus organizmu, činnosť vylučovacích žliaz, peristaltiku čriev a má aj diuretické účinky. Mladé rastliny sa zbierajú na jar ako šalátová zelenina.

## 2. *Urtica galeopsifolia* Wierzb. ex Opiz

### Prhl'ava konopnicolistá

*Urtica galeopsifolia* Wierzb. ex Opiz Naturalientausch 9: 107, 1825.

Syn.: *Urtica dioica* var. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Kanitz ex Wedd. 1869 – *U. dioica* var. *subinermis* Uechtr. – *U. dioica* subsp. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Chrtek 1982.

Rastlina sivastá, inak podobná druhu *U. dioica*. Čepeľ listov s početnými nepřhlivými chlpmi, bez přhlivých chlпов, na rube ± plstnatá. Prvé (najnižšie) súkvetie sa začína tvoriť na úrovni 13.–20. uzla.

Chromozómy:  $2n = 26$  (extra fines).

Celkové rozšírenie. Západná, stredná a východná Európa.

Rozšírenie na Slovensku. Na Slovensku sa očakáva výskyt v panónskej oblasti. Zaznamenané sú 2 historické údaje z Bratislavy. Degen sec. Gáyer na lokalite Bratislava, Líščie nivy „Fuchsenau“ – ut *U. dioica* var. *galeopsifolia* a Gáyer na lokalite Bratislava, dolné údolie Vydrice „Weidritzal“ – ut *U. dioica* var. *subinermis* (cf. Gáyer 1917a: 38).

## 3. *Urtica kioviensis* Rogow.

### Prhl'ava kyjevská

Ic.: Tab. 9, fig. 2, p. 81

*Urtica kioviensis* Rogow. Bull. Soc. Nat. Mosc. 16: 324, 1843.

Syn.: *Urtica radicans* Bolla 1856 non Sweet, nec Wight – *U. dioica* var. *kioviensis* (Rogow.) Wedd. 1856 – *U. bollae* Kanitz 1872 – *U. kioviensis* var. *radicans* (Bolla) Podp. 1932 – *U. dioica* subsp. *bollae* (Kanitz) Domin 1944 – *U. dioica* subsp. *kioviensis* (Rogow.) Domin 1944.

Trváca, jednodomá, len výnimočne dvojdomá bylina, s hrubými dlhými žltkastými podzemkami, tvoriaca rozsiahle trsy. Byľ na báze plazivá, vystúpavá, dutá, ľahko stlačiteľná, tenkostenná, nevýrazne hranatá, na uzloch bohato zakoreňujúca, s priemerom 5–8 mm, 50–200 cm (niekedy aj viac) vysoká, riedko pokrytá přhlivými chlpmi až holá (nepřhlivé chlpy chýbajú, alebo sú len veľmi vzácne), svetlozelená až do jesene. Listy stopkaté; stopky také dlhé ako 1/2 dĺžky čepele; prílistky