

9. *Salix acutifolia* Willd.

Vfba končistolistá

Salix acutifolia Willd. Sp. Pl. 4 (2), p. 668, 1806.

Syn.: *Salix violacea* Andrews 1809 – *S. pruinosa* Besser 1816 – *S. daphnoides*. var. *acutifolia* (Willd.) Döll 1859.

Rozložitý, 2–6 m vysoký ker s dlhými, tenkými, na koncoch previsnutými a nápadne oinovatenými konármi. Jednoročné konáriky červené až červenohnedé, výrazne oinovatené, previsnuté. Listové púčiky asi 4 mm dlhé; kvetné púčiky 7–9 mm dlhé, holé. Prílistky kopijovité, žliazkatopilkovité, zrastené so stopkou listov, opadavé zároveň s listami. Listy stopkaté, previsnuté; stopka listov 10–15 mm dlhá; čepeľ listov úzko kopijovitá, 60–100×10–15 mm veľká, žliazkatopilkovitá, na líci zelená, lesklá, na rube so sivastým povlakom, na obidvoch stranách holá. Jahňady sediace, valcovité, 25–35×7–15 mm veľké. Podporné listene na vrchole hnedočierne, husto dlho chlpaté. Tyčinkové kvety s 2 tyčinkami; nitky holé; piestikové kvety so stopkatým piestikom; semenník holý; čnelka zreteľná; blizny 2-zárezové; nektáriová žliazka 1, úzko valcovitá.

Chromozómy: $2n = 38$ (extra fines).

Biológia, ekológia, pôvod. Kvitnutie apríl, pred pučaním listov. Domáca vo východnej a severovýchodnej Európe a v Kazachstane, kde rastie na piesočnatých brehoch riek a na piesočnatých presypoch. U nás len pestovaná.

Úžitkovosť. V lesníctve sa využíva na spevňovanie piesočnatých stanovišť.

10. *Salix elaeagnos* Scop.

Vfba sivá

Ic.: Tab. 24, fig. 3, p. 236

Salix elaeagnos Scop. Fl. Carn. 2, ed. 2, p. 257, 1772.

Syn.: *Salix incana* Schrank 1789.

Strom alebo mohutný ker, 6–10(–12) m vysoký, s metlovitou korunou, vo vyšších polohách iba ker. Kmeň priamy, s priemerom až 25 cm. Borka sivá, hladká. Jednoročné konáriky slabo hranaté, matno tmavočervené, riedko chlpaté. Púčiky 2–3 mm dlhé, sploštené, kvetné nerozlíšené. Prílistky slabo vyvinuté. Stopka listov 2–4 mm dlhá. Čepeľ listov čiarkovito obrátene kopijovitá, úzko kopijovitá až čiarkovitá, takmer celistvookrajová, na okraji podvinutá, 60–100×6–8 mm veľká, na líci tmavozelená, riedko chlpatá až lysavejúca, na rube sivobielo plstnatá, zasychaním černejúca; chlpy rovnobežné s bočnými žilami. Jahňady sediace, úzko val-